


Защитите Вашего ребенка от коклюша

Почему беременным женщинам следует делать прививку от коклюша?



- Коклюш – это респираторная инфекция, которая может вызвать серьезное заболевание у маленьких детей. Заболевание наиболее опасно для непривитых детей младше 1 года.
- Вакцинация во время беременности защищает ребенка от коклюша с рождения до первой дозы вакцины в возрасте 3 месяцев.
- Вакцина против коклюша предлагается беременным женщинам во многих частях мира и обеспечивает младенцам хорошую защиту от коклюша.

Как действует вакцина?



- Организм беременных женщин, получающих вакцину, вырабатывает защитные антитела. Антитела передаются ребенку в утробе матери.
- Для того, чтобы Ваш ребенок получил защиту, Вы должны получить вакцину во время беременности – независимо от того, когда Вы сделали предыдущую прививку от коклюша.

Во время и после вакцинации



- Вакцинация рекомендуется на дородовом осмотре на 24-й неделе.
- Вакцина вводится в плечо.
- Обычно чувствуется лёгкая боль в месте укола, а также там могут возникнуть небольшое покраснение и припухлость. У некоторых поднимается температура, болят мышцы, а кто-то чувствует себя немного больным или слабым. Обычно это проходит само по себе через несколько дней.
- Не наблюдалось побочных эффектов у детей после вакцинирования матери против коклюша во время беременности.
- Обратитесь к медицинскому персоналу, если у Вас есть вопросы или обеспокоенность недомоганием после вакцинации.