

Om ukerapporten

Her følger siste ukes resultater fra Symptometer.


De ukentlige spørreskjemaene sendes til deltagerne på mandager. Det ble ikke sendt ut skjema i sommerukene 26 - 29 i 2021 og 29, 30 og 51 i 2022.

For uke 2023-13 var det 4647 personer (19 % av deltagerne) som hadde besvarte ukeskjemaet. For uke 2023-14 var det kl. 12. april 2023 3447 personer (14 % av deltagerne) som hadde besvart ukeskjemaet.

Forekomst av symptomer i befolkningen

Figurene under viser estimert forekomst i befolkningen i Norge, og fordelt på fylker og de mest folkerike kommunene for henholdsvis forkjølelssymptomer (definert som minst ett av følgende symptomer: hoste, sår hals, tungpustethet eller rennende nese) og feber i kombinasjon med hoste.


Figur 1. Utvikling av forkjølelssymptomer og feber i kombinasjon med hoste for ukene 2020-45 til 2023-14 fordelt i Norge.



Sist oppdatert: 2023-04-12


Figur 2.1. Kartet viser estimert prevalens av forkjølelsessymptomer i befolkningen per fylke i uke 14. Forkjølelsessymptomer er definert som minst en av følgende symptomer: hoste, sår hals, tungpustethet eller rennende nese.

Forkjølelsessymptomer
Uke 2023-14




Sist oppdatert: 2023-04-12

Figur 2.2. Utvikling av forkjølelsessymptomer for siste 10 uker fordelt på fylker.




Sist oppdatert: 2023-04-12

Figur 2.3. Utvikling av forkjølelssymptomer for ukene siste 10 uker fordelt på de mest folkerike kommunene.



Figur 2.4 Kartet viser estimert prevalens av feber i kombinasjon med hoste i befolkningen per fylke i uke 14.


Hoste og feber
Uke 2023-14



Covid-19 prøveresultater


Blant deltakerne i Symptometer oppga 23629 (63 %) at de har blitt testet for koronavirus minst én gang i perioden fra august 2021 og frem til nå. Av alle testene ble det påvist koronavirus i 15 prosent (12361) av tilfellene, mens det i 75 prosent (61745) av testene ikke ble påvist koronavirus. For de resterende testene var testsvarene ikke klare da undersøkelsen ble besvart.

Figur 3.1. Estimert prosentandel som tester seg for koronavirus siden august 2021, og hvilken type test de har tatt. Fra og med uke 2021-40 foreligger opplysninger om type test.




Sist oppdatert: 2023-04-12

Figur 3.2. Prosentandel blant respondenter som oppgir å ha fått påvist koronavirus i ukene 2021-30 til 2023-14, fordelt på type test. Fra og med uke 2021-40 foreligger opplysninger om type test.




Sist oppdatert: 2023-04-12

Figur 3.3. Prosentandel blant de som har oppgitt å ha testet seg som oppgir å ha fått påvist koronavirus i ukene 2021-30 til 2023-14, fordelt på type test. Fra og med uke 40/2021 foreligger opplysninger om type test.



Sist oppdatert: 2023-04-12

Figur 3.4. Prosentandel av respondenter som siden august 2020 har oppgitt ulike symptomer fordelt etter negativt eller positivt prøveresultat.



Sist oppdatert: 2023-04-12

Tabell 1. Symptomer fordelt etter prøveresultat (antall respondenter siden august 2020) og prosentandel positive per symptom.


Symptom	Negativ	Positiv	ProsentPositiv
Endret smak- og luktesans	1 622	2 664	62,2
Hoste og feber	3 956	5 448	57,9
Muskel- eller leddsmerter	5 024	5 645	52,9
Feber	6 518	6 997	51,8
Svimmel	2 732	2 727	50,0
Appetittmangel	3 194	3 093	49,2
Brystsmerter	1 549	1 460	48,5
Tungpustet	4 375	3 702	45,8
Hodepine	8 387	6 631	44,2
Hoste	11 180	8 234	42,4
Sliten eller utmattet	11 636	8 522	42,3
Røde øyne	1 437	1 037	41,9
Utslett	594	408	40,7
Diaré	2 028	1 350	40,0
Rennende nese	12 128	7 797	39,1
Magesmerter	2 206	1 414	39,1
Kvalme eller oppkast	1 930	1 236	39,0
Sår hals	10 901	6 816	38,5
Forkjølelsessymptomer	17 961	10 341	36,5
Minst ett symptom	22 599	11 393	33,5

Begrunnelse for testing

Tabell 2. Begrunnelse for testing basert på prøveresultat og sannsynligheten for å få et positivt resultat. Basert på respondenters svar siden august 2020.

Testgrunn	Negativ	Positiv	% Positiv (CI)
Symptom	18 765	8 378	12,77 (12,52, 13,03)
Kontakt med smittet	11 824	5 114	7,80 (7,59, 8,01)
Eget ønske	14 902	2 554	3,89 (3,75, 4,05)
Arbeidssituasjon	10 001	1 148	1,75 (1,65, 1,85)
Har vært i utlandet	4 304	577	0,88 (0,81, 0,95)
Deltakelse på arrangement	2 177	253	0,54 (0,48, 0,61)
Helseplage	2 033	314	0,48 (0,43, 0,53)
Annet	3 124	248	0,38 (0,33, 0,43)
Anbefalt fra helsepersonell	2 067	159	0,24 (0,21, 0,28)
Skal til utlandet	752	75	0,16 (0,13, 0,20)
Anbefalt fra Smittestopp	392	70	0,11 (0,08, 0,13)
Studier eller skolegang	134	24	0,05 (0,03, 0,08)

Figur 4. Prosentandel (95% konfidensintervall) for begrunnelse for testing fordelt etter negativt eller positivt prøveresultat. Basert på respondenters svar siden august 2020.




Sist oppdatert: 2023-04-12

Symptomprevalens og testresultat


Basert på det respondentene har rapportert om symptomer, testaktivitet og testresultat kan vi sammenligne forekomsten av enkelte symptomer hos de som fikk påvist koronavirus mens deltavarianten var dominerende med forekomsten av symptomer hos de som fikk påvist koronavirus når omikronvarianten ble dominerende.

Figur 5.1. Andel av dem som har fått påvist koronavirus som har rapportert endret smak- og luktesans i periodene fra uke 2021-31 t.o.m. uke 2021-48 (periode da delta-variant var dominerende) og f.o.m. 49-2021 til uke 2023-14 (periode da omikron-variant var dominerende).




Sist oppdatert: 2023-04-12

Figur 5.1. Andel av dem som har fått påvist koronavirus som har rapportert forkjølelsessymptomer i periodene fra uke 2021-31 t.o.m. uke 2021-48 (periode da delta-variant var dominerende) og f.o.m. 49-2021 til uke 2023-14 (periode da omikron-variant var dominerende).



Sist oppdatert: 2023-04-12

Figur 5.1. Andel av dem som har fått påvist koronavirus som har rapportert feber i kombinasjon med hoste i periodene fra uke 2021-31 t.o.m. uke 2021-48 (periode da delta-variant var dominerende) og f.o.m. 49-2021 til uke 2023-14 (periode da omikron-variant var dominerende).



Sist oppdatert: 2023-04-12