

Om ukerapporten

Her følger siste ukes resultater fra Symptometer.


De ukentlige spørreskjemaene sendes til deltagerne på mandager.

For uke 2024-15 var det 3691 personer (15 % av deltagerne) som hadde besvarte ukeskjemaet. For uke 2024-16 var det kl. 11 24. april 2024 3170 personer (13 % av deltagerne) som hadde besvart ukeskjemaet.

Forekomst av symptomer i befolkningen

Figurene under viser estimert forekomst i befolkningen i Norge, og fordelt på fylker og de mest folkerike kommunene for henholdsvis forkjølelssymptomer (definert som minst ett av følgende symptomer: hoste, sår hals, tungpustethet eller rennende nese) og feber i kombinasjon med hoste.

Figur 1. Utvikling av forkjølelssymptomer og feber i kombinasjon med hoste for ukene 2020-45 til 2024-16 fordelt i Norge.




Sist oppdatert: 2024-04-24

Covid-19 prøveresultater


Blant deltakerne i Symptometer oppga 23625 (63 %) at de har blitt testet for koronavirus minst én gang i perioden fra august 2021 og frem til nå. Av alle testene ble det påvist koronavirus i 16 prosent (13907) av tilfellene, mens det i 74 prosent (64099) av testene ikke ble påvist koronavirus. For de resterende testene var testsvarene ikke klare da undersøkelsen ble besvart.

Figur 2.1. Estimert prosentandel som tester seg for koronavirus siden august 2021, og hvilken type test de har tatt. Fra og med uke 2021-40 foreligger opplysninger om type test.




Sist oppdatert: 2024-04-24

Figur 3.2. Prosentandel blant respondenter som oppgir å ha fått påvist koronavirus i ukene 2021-30 til 2024-16, fordelt på type test. Fra og med uke 2021-40 foreligger opplysninger om type test



Sist oppdatert: 2024-04-24

Figur 3.3. Prosentandel blant de som har oppgitt å ha testet seg som oppgir å ha fått påvist koronavirus i ukene 2021-30 til 2024-16, fordelt på type test. Fra og med uke 40/2021 foreligger opplysninger om type test.



Sist oppdatert: 2024-04-24

Tabell 1. Symptomer fordelt etter prøveresultat (antall respondenter siden uke 2020-44) og prosentandel positive per symptom.

Symptom	Negativ	Positiv	ProsentPositiv
Endret smak- og luktesans	1 858	3 141	62,8
Hoste og feber	4 589	6 229	57,6
Muskel- eller leddsmerter	5 603	6 463	53,6
Feber	7 351	8 019	52,2
Svimmel	2 990	3 132	51,2
Appetittmangel	3 621	3 652	50,2
Brystsmerter	1 724	1 637	48,7
Tungpustet	5 015	4 267	46,0
Hodepine	9 210	7 558	45,1
Røde øyne	1 588	1 232	43,7
Sliten eller utmattet	12 949	9 727	42,9
Hoste	12 509	9 304	42,7
Utslett	646	473	42,3
Diaré	2 195	1 566	41,6
Kvalme eller oppkast	2 095	1 446	40,8
Magesmerter	2 392	1 610	40,2
Rennende nese	13 360	8 966	40,2
Sår hals	11 920	7 674	39,2
Forkjølelsessymptomer	19 675	11 720	37,3
Minst ett symptom	24 511	12 869	34,4

Begrunnelse for testing

Tabell 2. Begrunnelse for testing basert på prøveresultat og sannsynligheten for å få et positivt resultat. Basert på respondenters svar siden uke 2020-44.

Testgrunn	Negativ	Positiv	% Positiv (CI)
Symptom	20 255	9 512	13,69 (13,44, 13,95)
Kontakt med smittet	12 166	5 460	7,86 (7,66, 8,06)
Eget ønske	15 793	3 037	4,37 (4,22, 4,53)
Arbeidssituasjon	10 128	1 305	1,88 (1,78, 1,98)
Har vært i utlandet	4 403	678	0,98 (0,90, 1,05)
Deltakelse på arrangement	2 246	299	0,59 (0,52, 0,66)
Helseplage	2 220	406	0,58 (0,53, 0,64)
Annet	3 170	291	0,42 (0,37, 0,47)
Anbefalt fra helsepersonell	2 174	184	0,26 (0,23, 0,31)
Skal til utlandet	770	81	0,16 (0,13, 0,20)
Anbefalt fra smittestopp	390	69	0,10 (0,08, 0,13)
Studier eller skolegang	140	27	0,05 (0,03, 0,08)

Figur 4. Prosentandel (95% konfidensintervall) for begrunnelse for testing fordelt etter negativt eller positivt prøveresultat. Basert på respondenters svar siden uke 2020-44.

