

GONOREA (KAPAVAC)

Gonorea je seksualno prenosiva bolest koja se prenosi seksualnim aktivnostima, kontakta između polnih organa ili kontaktom polnih organa sluzokožom usta ili rektuma. Infekcija je veom azarazna i izaziva je bakterija; gonokoka. Gonokoka dobro uspeva na sluzokoži i najčešće se pronalazi u polnim organima, mokraćnom kanalu, rektumu i grlu. Bakterija se takođe može proširiti u krv i druge organe u telu i prouzrokovati zapaljenja. Gonoreja je trenutno retka bolest u Norveškoj, ali je više rasprostranjena u drugim delovima sveta.

Pravilno korišćenje kondoma štiti od zaraze. Kondom mora biti navučen tokom celog snošaja.

SIMPTOMI

Kod većine muškaraca simptomi gonoreje se pokazuju posle jednog do dva dana ili u roku od jedne sedmice. Dolazi do pečenja pri mokrenju i sekreta iz mokraćnog kanala, često veoma obilnog. Gonoreja se kod muškaraca može proširiti na posemenike i dovesti do sterilnosti.

Žene mogu imati slične simptome kao muškarci a i uz sve to belo pranje iz rodnice. Simptomi su blaži i često toliko malo izraženi da su neprimetni. Žene mogu takođe imati i neredovna krvarenja. Gonoreja se kod žena može proširiti na jajovode i dovesti do sterilnosti.

Ukoliko je trudnica zaražena gonorejom pri porođaju se i beba može zaraziti i dobiti zapaljenje očiju. Gonoreja koja se ne leči može kod novorođenčadi dovesti do slepila u roku od nekoliko dana.

PREGLED

Uzorci za dokazivanje gonoreje se uzimaju štapićem s vrhom od vate iz mokraćnog kanala i iz grlića materice, eventualno iz grla rektuma. Uzimaju se uzorci za odgajanje kulture bakterija i šalju u laboratoriju.

LEČENJE

Gonoreja se leči antibioticima. Svi se moraju odazvati na ponovnu kontrolu posle jedne do dve sedmice. Uzimaju se novi uzorci za laboratoriju, i ovi uzorci pokazuju dali ste ozdravili.

Seks se nesme imati dok ne se izvrši kontrola nakon lečenja i ne proglase vas zdravim.

BESPLATAN PREGLED I LEČENJE

Gonoreja je definisana u Zakonu o zaštiti od zaraza kao opšte opasna zarazna bolest. To uključuje pravo na besplatne preglede i lečenje. Ukoliko je došlo do zaraze važno je informisati sadašnjeg i bivše partnere o tome.

Lekar i pacijent moraju sarađivati u potrazi za izvorom zaraze sa ciljem da se seksualni kontakti (partneri) koji mogu biti zaraženi pregledaju i eventualno leče.