

## **FRENGİ**

Frengi, cinsel faaliyet sırasında, cinsel organlar arasında veya cinsel organ ile ağızdaki veya makattaki mukoza arasındaki temas aracılığıyla bulaşan, cinsel yoldan geçen bir hastalıktır. Hastalık, hamilelik sırasında anneden çocuğa ve kan nakli yoluyla da bulaşabilir.

Frengi, son 10 yıldır Norveç'te hemen hemen ortadan kaldırılmış idiyse de, günümüzde yine olağan hale gelmiştir. Hastalık, Oslo'da erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler arasında patlama yapmıştır. Hastalık, şimdilerde karşı cinse ilgi duyanlar arasında da daha sık görülmektedir. Frengi, eski Sovyetler Birliği ülkeleri, bir çok gelişmekte olan ülke ve ABD'nin bazı büyük şehirlerinde olağan olarak rastlanılan bir hastalıktır.

Doğru şekilde kullanılan prezervatif bulaşmaya karşı koruyucudur. Prezervatif, cinsel ilişki boyunca çıkarılmamalıdır.

## **BELİRTİLER**

Frengi üç aşamada gelişir:

### **1. aşama**

Hastalığın bulaşmasından yaklaşık üç hafta sonra, bakterilerin vücuda girdiği yerde bir yara ortaya çıkar. Bu yara genellikle cinsel organlardadır, ama makat, ağız veya vücudun diğer yerlerinde de oluşabilir. Yara fazla ağrı yapmaz ve bir kaç hafta sonra tedavisiz, kendi kendine kaybolur. Yaraya en yakın olan lenf bezleri şişer, fakat acı vermez. Bazen, hastalığın bu ilk aşaması farkedilmez.

### **2. aşama**

Hastalık 1. aşamada tedavi edilmeyecek olursa, bir-iki ay sonra 2. aşamaya geçer. 2. aşamada en çok ortaya çıkan şikayetler, vücutta çeşitli türlerde kızarıklık, saç dökülmesi, lenf bezlerinde şişme, biraz ateş, baş ağrısı ve yorgunluktur.

### **Gizli seyreden dönem**

Hastalık 2. aşamada tedavi edilmeyecek olursa, kişinin herhangi bir şikayetinin olmadığı gizli seyreden bir aşamaya girer. Cinsel yoldan hastalığı bulaştırma tehlikesi azalır, fakat hamilelik sırasında hala cenine bulaşabilir.

### **3. aşama**

Yıllar sonra hastalık, beyin, kalp-damar, cilt ve kemiklere saldırdığı 3. aşamaya geçebilir.

## **MUAYENE**

Doktorada yapılan basit bir kan tahlili kişide frengi olup olmadığını gösterebilir. Ancak tahlilin pozitif çıkması için, bulaşma durumunun üzerinden bir kaç hafta geçmiş olması gerekebilir.

## **TEDAVİ**

Penisilin iğneleri frengiye karşı yüzde yüz etkilidir. Penisiline allerjisi olanlar için başka etkili ilaçlar vardır.

Kişi, iyileşmiş ilan edilmeden önce cinsel ilişkide bulunmamalıdır.

## **ÜCRETSİZ MUAYENE VE TEDAVİ**

Bulaşıcı hastalıklara karşı korunma yasasında frengi, kamu sađlığı açısından tehlikeli olarak deđerlendirilmektedir. Bu durum, ücretsiz muayene ve tedavi hakkını içerir. Kişinin şimdiki ve daha önceki eşlerine, hastalığa yakalanmış olduğunu bildirmesi çok önemlidir. Doktor ve hastanın işbirliği yaparak hastalığın nasıl bulaştığını tespit etmeleri, cinsel ilişkide bulunulan ve hastalığı kapmış olabilecek kişilerin muayene ve tedavisi bakımından gereklidir.