

## **LA BLENNORRAGIE**

La blennorragie est une maladie sexuellement transmissible qui contamine lors des rapports sexuels par le contact entre les organes sexuels ou entre les organes sexuels et les muqueuses de la bouche ou du rectum. L'infection, très contagieuse, est causée par une bactérie, le gonocoque. Les gonocoques prolifèrent surtout sur les muqueuses et on les trouve le plus souvent dans les organes sexuels, les voies urinaires, le rectum et la gorge. Cette bactérie peut aussi se propager au sang ou à d'autres organes du corps provoquant une inflammation de ces organes. Pour le moment, la blennorragie est une maladie rare en Norvège mais plus répandue dans d'autres parties du monde.

Un préservatif correctement utilisé protège contre la contamination. Le préservatif doit être utilisé pendant toute la durée de l'acte sexuel.

### **LES SYMPTÔMES**

Chez la plupart des hommes, les symptômes de la blennorragie apparaissent après un ou deux jours ou au cours de la première semaine qui suit la contamination. L'évacuation des urines provoque des sensations de brûlure et des écoulements, souvent importants, se produisent par l'urètre. Chez les hommes, la blennorragie peut se propager aux épидidymes et entraîner la stérilité.

Chez les femmes les symptômes peuvent ressembler à ceux des hommes avec en plus des écoulements provenant du vagin. Les symptômes sont plus faibles, à tel point qu'ils passent souvent inaperçus. Les femmes peuvent aussi avoir des saignements irréguliers. La blennorragie peut se propager aux trompes utérines et causer stérilité.

Si la femme est atteinte de blennorragie quand elle accouche, ceci peut provoquer une infection des yeux chez l'enfant. Chez le nouveau-né, une blennorragie non traitée peut mener à la cécité en quelques jours.

### **EXAMEN**

Des prélèvements sont pris de l'urètre ou du col de l'utérus, éventuellement de la gorge ou du rectum, à l'aide d'un coton-tige. Ces prélèvements destinés à la culture sont envoyés en laboratoire.

### **TRAITEMENT**

La blennorragie se traite par les antibiotiques. Une personne atteinte sous traitement doit se rendre à une visite de contrôle au bout d'une ou deux semaines. De nouveaux prélèvements seront effectués et ces prélèvements indiquent si la personne est guérie.

Il ne faut pas avoir de relations sexuelles avant de s'être rendu à la visite de contrôle et avant que la guérison ait été constatée.

### **EXAMEN ET TRAITEMENT GRATUITS**

La blennorragie est définie comme étant une maladie contagieuse constituant un danger public selon la loi sur la protection contre les contagions. Ceci donne droit à des examens et du traitement gratuits. Il est important d'informer les partenaires actuels et passés que l'on est contaminé.

Le médecin et le patient doivent coopérer afin de retrouver les personnes susceptibles d'être contaminées pour pouvoir les examiner et les traiter.