

# KLAMIDIJA

Klamidija je seksualno prenosiva bolest koja se prenosi seksualnim aktivnostima, kontaktom između polnih organa ili kontaktom polnih organa sa sluzokožom usta ili rektuma. Infekcija je izazvana bakterijom koja dobro uspeva na sluzokoži polnih organa, mokraćnom kanalu i rektumu. Bakterija takođe može prouzrokovati i infekciju sluzokože oka.

Pravilno korišćenje kondoma štiti od zaraze. Kondom mora biti navučen tokom celog snošaja.

## SIMPTOMI

Većina zaraženih klamidijom su bez simptoma tako da i ne znaju da su zaraženi. Klamidija može postojati dugo vremena bez simptoma, možda čak i više godina. Zbog toga novootkrivena klamidija ne mora da znači preljubu (neverstvo).

I muškarce i žene može peći prilikom mokrenja, tako da se simptomi lako mogu pomešati sa simptomima katara mokraćne bešike koji je uobičajen među mlađim ženama, i ređe među mlađim muškarcima. U retkim slučajevima klamidija može prouzrokovati tegobe sa zglobovima.

Ženama se takođe može promeniti i belo pranje, ili može doći do manjih krvarenja tokom snošaja ili između menstruacija. Bakterija klamidije može se preneti na jajnike i prouzrokovati infekciju koja može dovesti do sterilnosti i hroničnih bolova u polnom organu. Zbog toga je važno otkriti bolest na vreme da bi se otpočelo sa lečenjem. Simptomi širenja bakterije na jajovode mogu biti bolovi u donjem truhu i temperatura. Pri ovakvim simptomima lečenje se mora brzo sprovesti.

Ukoliko je trudnica zaražena klamidijom pri porođaju se i beba može zaraziti i dobiti zapaljenje očiju ili zapaljenje pluća.

Muškarci mogu imati tegobe sa pečenjem i sekretom iz mokraćnog kanala, osipom na glaviću penisa i blagim bolovima u korenu penisa. Ukoliko se klamidija proširi do pasemenika može prouzrokovati infekciju mošnice koja u tom slučaju postaje bolna, crvena i otečena.

## PREGLED

Uzorci za dokazivanje klamidije uzimaju se štapićem s vrhom od vate iz mokraćnog kanala i iz grlića materice. Klamidija se može dokazati i preko mokraće. To je vrsta pregleda je sada uvedena na više mesta.

Svi koji imaju tegobe koje mogu ukazivati na klamidiju treba da se pregledaju. Pored toga sve mlade žene i muškarci bi trebali da se pregledaju ako su imali novog partnera posle zadnjeg pregleda za klamidiju.

## LEČENJE

Klamidija se leči antibioticima. U toku samog lečenja i sedmicu dana posle završenog tretmana nesme se imati polni snošaji.

Preporučuje se kontrola nekoliko sedmica posle završenog lečenja klamidije.

## BESPLATAN PREGLED I LEČENJE

Klamidija je definisana u Zakonu o zaštiti od zaraza kao opšte opasna zarazna bolest. To uključuje pravo na besplatne preglede i lečenje. Ukoliko je došlo do zaraze važno je informisati sadašnjeg i bivše partnere o tome.

Lekar i pacijent moraju sarađivati u potrazi za izvorom zaraze sa ciljem da se seksualni kontakti (partneri) koji mogu biti zaraženi pregledaju i eventualno leče.