

الكلاميديا مرض جنسي قابل للانتشار. تتم العدوى به عن طريق الممارسة الجنسية وبالتالي الإحتكاك بين الأعضاء التناسلية أو بين العضو التناسلي والغشاء المخاطي في الفم أو الشرج. سبب العدوى هو نوع من البكتيريا ينتعش في الغشاء المخاطي، وفي الأعضاء التناسلية والقناة البولية والشرج، وهذه البكتيريا قد تسبب أيضا "إلتهابا" في غشاء العين. إن الإستخدام الصحيح للواقي الذكري (Kondom) يساعد في الوقاية من العدوى. يجب أن يُستخدم هذا الواقي خلال مدة الجماع بكاملها.

h AK3A

إن معظم المصابين بمرض الكلاميديا لايشعرون بأي إزعاج يُذكر، لهذا السبب فهم لايعلمون بأنهم مصابون به. يمكن لداء الكلاميديا أن يبقى زمنا "طويلا" وربما لسنوات عديدة دون ظهور أية أعراض. ولذلك فإذا أكتشف هذا المرض حديثا " عند شخص ما، فهذا لايعني بالضرورة أن يكون سببه الخيانة الزوجية. يمكن لكل من الرجال والنساء أن يشعروا بحرق أثناء التبول، والذي يمكن بسهولة الخلط بينه وبين إلتهاب المثاني الذي هو شائع عند الشابات ونادر الحدوث عند الشباب. في بعض الحالات النادرة يمكن لهذا المرض أن يُسبب ألما" في المفاصل.

يمكن أن يحدث تغيرات في الإفرازات عند النساء، أو قد يحدث لهن نزيف بسيط أثناء الجماع أو بين فترات الحيض. يمكن لبكتيريا الكلاميديا أن تنتشر إلى قناة البيض مسببة إلتهاب قد يؤدي إلى العقم وكذلك آلام مهبلية مزمنة. لهذا السبب فمن الضروري كشف المرض في الوقت المناسب من أجل إعطاء العلاج. قد يكون من أعراض إنتشار العدوى إلى قناة البيض ألما" في أسفل البطن وإرتفاعا" في درجة الحرارة، لذا يُستحسن عند ظهور مثل هذه الأعراض إعطاء العلاج بسرعة.

عندما تلد امرأة مصابة بالكلاميديا، يمكن أن تنتقل العدوى لطفلها الوليد وقد يُصاب بالتهاب في العين أوالرتنين. قد يُصاب الرجال بحرق وإفرازات من القناة البولية، وقد يظهر طفح جلدي على رأس القضيب مع آلام طفيفة في مؤخرة القضيب. إن إنتشار باكتيريا الكلاميديا إلى كيس الصفن، قد يسبب إلتهابا" في كيس الخصية مما يؤدي إلى احمرار وتورم وكذلك إلى آلام شديدة.

f Rt(A

للكشف عن باكتيريا الكلاميديا، تؤخذ عينة من القناة البولية وعنق الرحم بواسطة عصا دقيقة في نهايتها قطنة. كما يمكن أيضا" الكشف عنها بواسطة تحليل البول. هذه هي طريقة الفحص التي يتم إعتماها الآن في أماكن متعددة. من المستحسن لجميع الذين يعانون من أعراض قد تشير إلى أنهم مصابون بمرض الكلاميديا أن يتم فحصهم. إضافة إلى ذلك فمن المستحسن لجميع الشباب والشابات أن يسعوا للفحص من جديد وذلك عند التقائهم بشريك آخر بعد الفحص الأخير.

O/2(A

تتم معالجة الكلاميديا عن طريق المضادات الحيوية، كما يجب على المرء ألا يقوم بأي جماع جنسي أثناء فترة العلاج، ولاحتى بعد أسبوع من إنتهاء العلاج. يُنصح بالمراجعة بعد إنتهاء العلاج ببضعة أسابيع.

"BB) aO(B) {A/f Rt(A

تم تعريف داء الكلاميديا في قانون الوقاية من الأمراض المعدية بأنه من الأمراض العامة الخطيرة والمعدية. هذا يُعطي الحق في الفحوصات والمعالجة مجانا". من الضروري إعلام الشريك الحالي والسابق في حال إصابة المرء بالمرض. سوف يتعاون المريض والطبيب في تعقب أثر الذين قد أصيبوا بالعدوى نتيجة ممارساتهم الجنس معه، وذلك لفحصهم وعلاجهم إذا تطلب الأمر.