

á1¼a {A-AX

السيلان هو مرض جنسي قابل للإنتشار، تتم العدوى به عن طريق الممارسات الجنسية وبالتالي الإحتكاك بين الأعضاء التناسلية أو بين العضو التناسلي والغشاء المخاطي في الفم أوالشرح. إن الإصابة بهذا المرض معدية للغاية وسببها نوع من الجراثيم يُدعى (gonokokken) بكتيريا السيلان. ينتعش هذا النوع من البكتيريا في الأغشية المخاطية، وغالبا " ما يتواجد في الأعضاء التناسلية و القناة البولية والشرح وكذلك الحلق. يُمكن لهذه البكتيريا أن تنتقل إلى الدم وإلى أعضاء أخرى من الجسم مسببة إلتهاها " فيها. إن مرض السيلان نادر حدوثه في الوقت الحاضر في النرويج، ولكنه منتشر أكثر في أماكن أخرى من العالم. إن الإستخدام الصحيح للواقي الذكري (Kondom) يساعد في الوقاية من العدوى. يجب أن يُستخدم هذا الواقي خلال مدة الجماع بكاملها.

h AK3A

تظهر أعراض مرض السيلان عند معظم الرجال بعد يوم أو يومين أو ضمن أسبوع من الإصابة به. تكون الأعراض على شكل حريق عند التبول مع إفرازات من القناة البولية وغالبا " ماتكون غزيرة. يمكن للسيلان أن ينتقل إلى البربخ (مخزن تجمع الحيامل المنوية) مسببا " العقم عند الرجال.

قد تظهر عند المرأة نفس الأعراض التي تظهر عند الرجل، إضافة إلى إفرازات مهبلية مرافقة. وغالبا " ما تكون الأعراض ضعيفة وغير ملحوظة. يمكن للمرأة أيضا " أن تصاب بنزيف غير منتظم، كما يمكن أن تنتقل عدوى السيلان إلى قناة البيض مسببه العقم عندها.

إذا كانت المرأة مصابة بالسيلان عند الولادة، يمكن أن يؤدي هذا إلى إلتهاها في العين عند الوليد وقد يسبب له العمى بعد أيام قليلة إذا لم تتم معالجته.

f Rt{A

يتم فحص مرض السيلان عن طريق أخذ عينة من القناة البولية و عنق الرحم وفي بعض الأحيان من الشرح أو الحلق، وذلك بواسطة عودة دقيقة في نهايتها قطنة. يتم إرسال هذه العينة إلى المخبر لزراعتها.

Q1¼ {A

يُعالج السيلان بواسطة المضادات الحيوية. سوف تتم إعادة الفحص للجميع بعد أسبوع أو أسبوعين من أخذهم للعلاج. عند إعادة الفحص تُؤخذ من جديد عينة مخبرية، وهي التي تُؤكد لاحقا " ما إذا كنت قد شفيت من هذا المرض أم لا. على المرء ألا يمارس أي نشاط جنسي قبل ذهابه للفحص ثانية وبعد أخذه للعلاج، وبالتالي التأكد من أنه شفي تماما " .

"BBD} a O{B} {A¶f Rt{A

تم تعريف السيلان في قانون الوقاية من الأمراض المعدية، بأنه من الأمراض العامة الخطيرة والمعدية. هذا يُعطي الحق في الفحوصات والمعالجة مجانا ". من الضروري إعلام الشريك الحالي والسابق في حال إصابة المرء بالمرض. سوف يتعاون المريض والطبيب في البحث عن الذين قد أصيبوا بالعدوى نتيجة ممارساتهم الجنس معه، وذلك لفحصهم وعلاجهم إذا تطلب الأمر.