

Вакцинация против гриппа и COVID-19 на раз-два-три




Кому следует вакцинироваться?

- Всем гражданам в возрасте 65 лет и старше следует сделать обе прививки.
- Людям с хроническими заболеваниями, тяжелой формой ожирения или беременным также следует сделать прививки обеими вакцинами.
- Проконсультируйтесь со своим врачом, если у вас есть сомнения или вопросы.


Как действуют эти вакцины?

- Вакцины учат организм защищаться от вируса гриппа и коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.
- Обе вакцины вводятся одной дозой каждая, в форме укола в плечевую мышцу. Обе прививки можно сделать одновременно, вакцины вводятся отдельно в правую и левую руку.
- Вакцины начинают действовать спустя 1-2 недели после вакцинации.



После вакцинации

- Многие чувствуют боль в месте укола, оно может покраснеть и воспалиться.
- У некоторых поднимается температура, наблюдается мышечная боль, общее недомогание или усталость.
- Эти симптомы проходят сами собой через несколько дней.
- Если у вас есть вопросы относительно испытываемых вами недомоганий после прививки, свяжитесь с врачом.



Эту информационную страницу можно загрузить с www.fhi.no/influensavaksine и fhi.no/voksenvaksinasjon