

Om covid-19

Covid-19 (koronasykdom) gir i hovedsak luftveisinfeksjon, men kan også gi symptomer fra andre organer. Eldre og voksne med kroniske sykdommer har størst risiko for å få alvorlig koronasykdom. Barn og unge får svært sjelden alvorlig koronasykdom.

Om koronavaksinasjon av barn i alderen 6 måneder til og med 4 år

Folkehelseinstituttet har vurdert at det er svært få barn i aldersgruppen 6 måneder - 4 år som vil ha behov for vaksine mot covid-19 i Norge. Likevel kan det være enkelte barn med alvorlig grunnsykdom som kan ha nytte av vaksinasjon etter individuell vurdering av lege som kjenner barnet. Barn og unge vil også kunne få god beskyttelse ved å gjennomgå koronainfeksjon.

I Norge benyttes kun mRNA-vaksinen Comirnaty (BioNTech/Pfizer) til barn og ungdom. En egen barnedose er godkjent til bruk fra 6 måneder til og med 4 år. Det anbefales at 2. dose gis 3 uker etter 1. dose, og at 3. dose gis ≥ 8 uker etter 2. dose. Hvis et barn fyller 5 år mellom dosene i grunnvaksinasjonsserien, bør det fullføre serien med dosenivå 3 $\mu\text{g}/\text{dose}$. Tidligere gjennomgått covid-19 reduserer behovet for ytterligere vaksinasjon og kan tas med i vurderingen av antall doser.

De vanligste meldte bivirkningene er milde/moderate, oppstår 1-2 dager etter vaksinasjon og går over etter noen dager. For noen vil symptomene kunne være mer kraftige. Vanlige bivirkninger er smerter og hevelse på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Allergiske reaksjoner forekommer hos enkelte, men dette er svært uvanlig. For spedbarn er det i tillegg sett irritabilitet, søvnighet, redusert appetitt og utslett.

Betennelse i hjertemuskelen eller hjerteposen (myokarditt/perikarditt) kan i sjeldne tilfeller oppstå etter vaksinasjon. Dette er særlig observert etter andre vaksinedose hos ungdom og unge voksne. Andre sjeldne bivirkninger kan ikke utelukkes.

Før vaksinasjon

Vaksinering er frivillig. De som ikke har fylt 16 år, må ha foresatte sitt samtykke til vaksinering. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke. Gi beskjed dersom barnet tidligere har hatt alvorlig allergisk reaksjon, eller har fått annen vaksine for mindre enn en uke siden. Hvilke helseforhold som gjør at man ikke bør ta vaksinen eller at det trengs ekstra vurderinger, er beskrevet i [egegenerklæringskjema](#). Tilpasset informasjon for barna og utdypende informasjon om koronavaksinering av barn finner du på fhi.no/kvp.

Riv her

Barnets navn: _____

Fødselsdato: _____

Jeg/vi ønsker at barnet mitt/vårt vaksineres mot covid-19
Kryss av for hvilken dose det nå samtykkes til:

Dose 1

Dose 2

Dose 3

Foresatte med foreldreansvar: Foresatt 1: _____ Foresatt 2: _____

Foresatt 1: Fullt navn (skriv tydelig): _____

Foresatt 1: underskrift: _____ Telefonnummer: _____

Foresatt 2: Fullt navn (skriv tydelig): _____

Foresatt 2: underskrift: _____ Telefonnummer: _____

Evt informasjon om barnet til vaksinatør: