

## Informasjon til asylmottak – oppmerksomhet om difteri

Den siste tiden har det blitt observert flere tilfeller av huddifteri og enkelte tilfeller av halsdifteri ved asylmottak i noen europeiske land, inkludert Norge. Det bør være ekstra oppmerksomhet og lav terskel for å undersøke nyankomne for difteri.

### Hva er difteri?

Difteri er en bakteriesykdom som kan gi infeksjon i sår, hals og luftveier. I sjeldne tilfeller kan bakterien gi alvorlig sykdom. Difteri forekommer svært sjeldent i Norge, men er vanlig i mange land utenfor Vest-Europa og USA.

I Norge tilbys alle barn vaksine mot difteri. Voksne anbefales påfyll av vaksinen hvert 10. år. Vaksinen beskytter godt mot alvorlig sykdom, men vaksinerte kan fortsatt få bakterien i sår eller hals uten å være syke.

### Når bør difteri mistenkes?

Personer som jobber i asylmottak bør være ekstra observante på nyankomne med tegn til difteri:

- Betente sår (rødt, hovent, vondt, puss)
- Sår som ikke vil gro
- Sår hals i kombinasjon med feber

**Mistanken øker hvis personen i tillegg har vært i kontakt med noen som har fått påvist difteri.**

### Hva bør gjøres ved mistanke?

Dersom du mistenker difteri hos en nyankommen bør du bistå den nyankomne med å komme i kontakt med helsetjenesten så raskt som mulig. Hvis personen har sår, bør personen selv dekke til dette med plaster.

### Råd om vaksinasjon til ansatte

Vaksine mot difteri beskytter godt mot alvorlig sykdom. Alle voksne bør derfor fyller på difteri-holdig vaksine (DTP-Polio) hvert 10. år. Les mer om [oppfriskningsdose her](#).

### Vaksinasjon av flyktninger og asylsøkere

Flyktninger og asylsøkere kan ha økt risiko for å bli smittet med enkelte sykdommer. Helsetjenesten skal sørge for at vaksinasjonsstatus undersøkes og aktuelle vaksiner tilbys. Les mer om [dette her](#).