

حول كوفيد-19

يسبب كوفيد-19 بشكل رئيسي التهابات الجهاز التنفسي، ولكن يمكن أن يسبب أيضًا أعراضًا من أعضاء أخرى. يكون كبار السن والبالغون المصابون بأمراض مزمنة أكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد-19 الخطير. عادة ما يكون لدى الأطفال الذين يمرضون مسارًا خفيفًا للمرض مصحوبًا بأعراض تنفسية خفيفة وقصيرة المدى. وغالبًا ما يحصل لدى الشباب شعور عام بالمرض والصداع وآلام العضلات. خطر الإصابة بمرض خطير لدى الأطفال والشباب منخفض. ومع ذلك، سيساعد التطعيم على حماية القلة الذين يمكن أن يمرضوا بشكل خطير إذا أصيبوا بالعدوى، بالإضافة إلى الحد من انتشار العدوى في المجتمع.

حول اللقاحات

تمت الموافقة على استخدام لقاحات الرنا المرسال كوميرناتي (Pfizer و BioNTech) Comirnaty و Spikevax (Moderna) لمن هم من سن 12 عامًا فما فوق. لا تحتوي اللقاحات على فيروسات حية ولا يمكن أن تسبب الإصابة بعدوى كورونا. بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا (مواليد السنين من 2006-2009)، يُوصى بأخذ جرعة واحدة فقط. يُنصح الشباب الأكبر سنًا بجرعتين بفاصل 8-12 أسبوعًا. يُوصى أيضًا بجرعتين من اللقاح للأطفال المصابين بمرض كامن خطير وربما لبعض الأطفال المعرضين لمخاطر إضافية أخرى بناءً على تقييم من قبل الطبيب. بالنسبة لأولئك الذين سبق أن أصيبوا بكوفيد-19 في سن 12-15 عامًا، لا يُنصح بالتطعيم حاليًا، بينما يتم تقديم جرعة لقاح واحدة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا. الحماية من الإصابة بالمرض بشكل خطير تكون جيدة بالفعل بعد ثلاثة أسابيع من تلقي الجرعة الأولى.

تحدث الغالبية العظمى من الآثار الجانبية بعد يوم أو يومين من التطعيم، وهي خفيفة / معتدلة وتختفي بعد بضعة أيام. ولكن بالنسبة للبعض، قد تكون الأعراض أكثر حدة. يبدو أن هذه اللقاحات تسبب المزيد من الآثار الجانبية المعتادة مقارنة باللقاحات الأخرى. تشمل الآثار الجانبية الشائعة آلام وتورم في موقع الحقن والإرهاق والصداع وآلام العضلات والقشعريرة وآلام المفاصل والحمى. تحدث ردود فعل تحسسية عند بعض الناس. هناك معلومات جيدة عن الآثار الجانبية الشائعة بعد التطعيم، ولكن لا يمكن استبعاد الآثار الجانبية النادرة.

يمكن أن يحدث التهاب في عضلة القلب (myokarditt) في حالات نادرة بعد التطعيم بلقاح الرنا المرسال. تحدث الحالة عادةً في غضون أسبوع بعد تلقي الجرعة الثانية، وتكون مؤقتة بحيث يتعافى معظم الأشخاص في غضون شهر واحد. تسبب الحالة ألمًا في الصدر وأزيزًا وخفقانًا في القلب وحمى. في حالة حدوث مثل هذه الأعراض، يجب استشارة الطبيب وفحص الشاب. قيم أطباء القلب النرويجيون أن مرض كوفيد-19 يمكن أن يسبب آثارًا قلبية أكثر خطورة لدى بعض الأشخاص مما يمكن أن يحدث بعد اللقاح، وأن هذا التأثير الجانبي لا ينبغي أن يمنع الشباب من الحصول على اللقاح. اقرأ المزيد عن اللقاحات في fhi.no.

قبل التطعيم

إذا لم يكن الطفل أو الشاب قد بلغ سن 16، يجب أن يوافق أولياء الأمور على التطعيم. وفي حالة المسؤولية الوالدية (الحضانة) المشتركة، يجب أن يوافق كلا الوالدين. للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا الحق أيضًا في تلقي المعلومات ويجب الاستماع إلى رأيهم تبعًا لسنهم ومدى نضجهم. يمكن العثور على معلومات مبسطة مع الرسومات في كتيب لقاح كورونا للشباب الذين أعمارهم من 12-15 سنة (Koronavaksine for ungdom 12-15 år). أخبرونا إذا كان الطفل قد عانى سابقًا من رد فعل تحسسي شديد، أو تان قد تلقى لقاحًا آخرًا منذ أقل من أسبوع. تم وصف الظروف الصحية التي تعني أنه لا ينبغي للمرء أن يأخذ اللقاح أو أن هناك حاجة إلى تقييمات صحية إضافية، في [استمارة الإقرار الذاتي](http://fhi.no). يمكن العثور على معلومات مفصلة على fhi.no.

قص هنا

تاريخ الميلاد:

اسم الطفل:

يُلَقَّح طفلي/طفلتنا ضد كوفيد-19

أنا/نحن نرغب في أن:

ولي الأمر 2:

أولياء الأمور الذين يتولون المسؤولية الوالدية: ولي الأمر 1:

ولي الأمر 1: الاسم الكامل (أكتب بخط واضح):

رقم الهاتف:

ولي الأمر 1: التوقيع:

ولي الأمر 2: الاسم الكامل (أكتب بخط واضح):

رقم الهاتف:

ولي الأمر 2: التوقيع:

معلومات ذات صلة حول الطفل للملِّق: