

Apie COVID-19

COVID-19 dažniausiai sukelia kvėpavimo takų infekcijas, tačiau gali sukelti ir kitų organų simptomus. Senyvo amžiaus žmonėms ir lėtinėmis ligomis sergantiems suaugusiems yra didžiausia sunkios COVID-19 ligos eigos rizika. Susirgusiems vaikams paprastai pasireiškia lengvi ir trumpalaikiai kvėpavimo takų simptomai. Paaugliai dažniau junda bendrą silpnumą, jiems skauda galvą ir raumenis. Sunkios ligos eigos rizika vaikams ir paaugliams yra maža. Tačiau skiepiai padės apsaugoti nedaugelį tų, kurie užsikrėtę gali sunkiai susirgti, taip pat sumažins užsikrėtimo atvejų skaičių visuomenėje.

Apie vakciną

mRNR vakcinos „Comirnaty“ („BioNTech“ ir „Pfizer“) ir „Spikevax“ („Moderna“) buvo patvirtintos naudoti vaikams nuo 12 metų amžiaus. Šiose vakcinose nėra gyvų virusų ir jos negali sukelti COVID-19 ligos. Vieną dozę rekomenduojama skirti 12–15 metų paaugliams (2006–2009 m. kohortos). Vyresniems paaugliams rekomenduojamos dvi dozės 8–12 savaitių intervalais. Asmenims, kurie anksčiau buvo pasiskiepiję nuo COVID-19, kai jiems buvo 12–15 metų, šiuo metu skiepytis nerekomenduojama, o 16–17 metų jaunuoliams siūloma viena vakcinos dozė. Pakankama apsauga nuo sunkios ligos eigos pasiekama jau praėjus trimis savaitėms po pirmosios.

Dauguma šalutinių poveikių pasireiškia praėjus 1–2 dienoms po skiepavimo, yra lengvi arba vidutinio sunkumo ir praeina po kelių dienų. Kai kuriems asmenims simptomai gali būti sunkesni. Atrodo, kad šios vakcinos sukelia daugiau bendrų šalutinių reiškinių nei kitos vakcinos. Dažnas šalutinis poveikis yra skausmas ir patinimas injekcijos vietoje, nuovargis, galvos skausmas, raumenų skausmas, šaltkrėtis, sąnarių skausmas ir karščiavimas. Kai kuriems žmonėms pasitaiko alerginių reakcijų. Apie dažną šalutinį poveikį po vakcinacijos yra pakankamai žinių, tačiau negalima atmesti reto šalutinio poveikio galimybes.

Retais atvejais po skiepavimo mRNR vakcinomis gali pasireikšti širdies raumens uždegimas (miokarditas). Ši būklė paprastai atsiranda per savaitę po antrosios dozės ir yra laikina, todėl dauguma žmonių pasveiksta per mėnesį. Būklė sukelia krūtinės skausmą, švokštimą, palpitacijas ir karščiavimą. Atsiradus tokiems simptomams, kreipkitės į gydytoją dėl medicininės apžiūros. Norvegijos kardiologai mano, kad COVID-19 liga kai kuriems žmonėms gali sukelti rimtesnį poveikį širdžiai nei vakcina ir šis šalutinis poveikis neturėtų užkirsti kelio paaugliams siūlyti vakcinos. Daugiau apie vakciną skaitykite fhi.no

Prieš skiepimą

Jei vaikui ar paaugliui nesukako 16 metų, tėvai turi duoti **sutikimą skiepyti. Bendros tėvų atsakomybės atveju sutikimą turi duoti abu tėvai**. Jaunesni nei 16 metų vaikai taip pat turi teisę gauti informaciją ir jų nuomonė turi būti išklaudyta, atsižvelgiant į jų amžių ir brandą. Supaprastintą informaciją su brėžiniais galima rasti brošiūroje „[Vakcina nuo koronaviruso 12–15 metų paaugliams](#)“. Praneškite mums, jei vaikui anksčiau buvo pasireiškusi sunki alerginė reakcija arba jis buvo paskiepytas kita vakcina mažiau nei prieš savaitę. Sveikatos būklės, dėl kurių negalima skiepytis arba reikalingas papildomas įvertinimas, aprašytos savideklaracijos formoje su informacija apie sveikatą. [Išsamią informaciją galima rasti fhi.no](#).

Čia

Vaiko vardas ir pavardė: _____ Gimimo data: _____

Aš (mes) noriu (norime), kad mano (mūsų) vaikas: _____ būtų paskiepytas nuo COVID-19

Tėvai, turintys tėvų pareigas: _____ Tėvas: _____

Motina: pilnas vardas ir pavardė (parašykite aiškiai): _____

Tėvas: parašas: _____ telefono numeris: _____

Motina: pilnas vardas ir pavardė (parašykite aiškiai): _____

Motina: parašas: _____ telefono numeris: _____

Galima informacija apie vaiką skiepiančiam asmeniui: