


## Badania na obecność gruźlicy (TB) po przyjeździe do Norwegii.

Wszystkie osoby ubiegające się o azyl oraz uchodźcy przybywający do Norwegii muszą przejść badania na obecność gruźlicy (TB). Inne przybywające osoby muszą zostać przebadane, jeśli pochodzą z kraju, w którym gruźlica jest powszechną chorobą. Badania obejmują prześwietlenie rentgenowskie płuc (badanie rentgenowskie klatki piersiowej) oraz badanie krwi lub próbę tuberkulinową.


### Badanie rentgenowskie klatki piersiowej:

Prześwietlenie trwa tylko kilka minut i nie jest szkodliwe dla zdrowia. Jest bezpieczne nawet dla kobiet w ciąży. Aby uzyskać jak najbardziej wyraźny obraz, do wykonania badania należy zdjąć górną część garderoby. Na życzenie mogą Państwo pozostać w cienkiej koszulce bez guzików i ozdób. Należy zdjąć biustonosz. Podczas badania należy wziąć głęboki oddech i wstrzymać powietrze.




Niektóre osoby muszą również wykonać badanie krwi lub próbę tuberkulinową.

### Badanie krwi (IGRA):



### Próba tuberkulinowa (Mantoux):



Wyniki badań nie będą dostępne od razu. Trzeba na nie poczekać kilka dni. Wyniki mogą wykazać, że konieczne są dodatkowe badania lub konsultacje lekarskie. W razie takiej potrzeby otrzymają Państwo skierowanie. Nie oznacza to, że chorują Państwo na gruźlicę.

Objawy gruźlicy obejmują przewlekły kaszel (trwający trzy tygodnie lub dłużej), gorączkę, utratę masy ciała, uczucie osłabienia i zmęczenia, nocne pocenie lub obrzęki, guzki w obrębie karku, pachwin lub pod pachami. Istnieje też możliwość, że w organizmie znajdują się bakterie gruźlicy, lecz choroba nie rozwija się. Tylko bakterie gruźlicy w płucach (gruźlica płuc) niepoddane leczeniu są zaraźliwe.

Osoby chore na gruźlicę zostaną bezpłatnie poddane leczeniu w Norwegii. Będą one miały prawo pobytu w Norwegii do czasu zakończenia leczenia.

Proszę pamiętać, że gruźlica jest chorobą uleczalną! Więcej informacji na temat gruźlicy można znaleźć na stronie [www.fhi.no](http://www.fhi.no).