

قبل تلقي التطعيم وبعده

قبل التطعيم، تسألُك ممرضة الصحة العامة عما إذا كان الطفل يتمتع بصحة جيدة أم لا وإذا كانت هناك أي ردود فعل بعد تلقي التطعيمات السابقة. يظهر معظم الأطفال ردود فعل قليلة أو معدومة جراء تلقي التطعيمات.

قبل تلقي التطعيم

قبل التطعيم، تسألُك ممرضة الصحة العامة عما إذا كان الطفل يتمتع بصحة جيدة أم لا وإذا كانت هناك أي ردود فعل بعد تلقي التطعيمات السابقة. تذكر أن تخبر الممرضة إذا كان الطفل يعاني من أي نوع من أنواع الحساسية أو أي مشاكل صحية أخرى، أو إذا تلقى الطفل مؤخرًا دواءً أو تطعيمًا خارج البرنامج.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الممرضة على علم إذا تلقت الأم أدوية أثناء فترة الحمل أو الرضاعة الطبيعية تؤثر على الجهاز المناعي؛ حيث يمكن أن تدعو الضرورة إلى إرجاء تلقي بعض التطعيمات.

ولا يشكل تطعيم طفل يعاني من الإصابة ببرد أو يعاني بخلاف ذلك من وعكة صحية طفيفة خطرًا عليه. إلا أنه من الطبيعي تأجيل التطعيم في حالة الإصابة بأحد الأمراض الحادة أو عند الإصابة بحمى مع تجاوز درجة الحرارة 38 درجة مئوية.

وبالنسبة للأطفال الذين عانوا من ردود فعل غير طبيعية بعد تلقيهم تطعيمات سابقة والأطفال المصابين بأمراض خطيرة أو طويلة الأمد، فينبغي لأحد الأطباء أن يقيم حالتهم الصحية قبل تلقي التطعيم. وفي بعض الحالات، يكون من الضروري الانحراف عن البرنامج.

بعد تلقي التطعيم

يحدث معظم الأطفال ردود فعل قليلة أو معدومة جراء تلقي التطعيمات. قد يمثل ارتفاع درجة الحرارة عن 39 درجة مئوية و/ أو انخفاض الحالة العامة علامةً على مرض خطير، وليس بالضرورة ردة فعل جراء تلقي التطعيم. لذلك، تواصل دائمًا مع الطبيب إذا انتابك القلق حيال حالة طفلك.

ردود الفعل نتيجة تلقي التطعيمات (الآثار الجانبية)

- تحدث، من حين لآخر، حمرة وتورم وألم في موضع الحقن بعد تلقي جميع التطعيمات المأخوذة عن طريق الحقن، ويمكن لهذه الأعراض أن تستمر عدة أيام.
- ينتج بعد تلقي التطعيم حمى متوسطة أو أرق أو بكاء أو نعاس أو شعور بالإعياء أو فقدان الشهية لدى طفل بين كل عشرة أطفال. بينما يعد ارتفاع درجة الحرارة عن 39 درجة مئوية أمرًا غير شائعًا.
- بالنسبة للأطفال الصغار، يمكن أن يؤدي الارتفاع السريع في درجة الحرارة إلى تشنجات الحمى. ولا تشكل تشنجات الحمى أي خطورة، ولكن ينبغي لك التواصل مع أحد الأطباء لاستثناء أي أمراض حادة أخرى.
- بالنسبة للأطفال الكبار فيشيع فيهم شحوب البشرة أو الشعور بالإعياء أو الإغماء بعد تلقي التطعيم عن الأطفال الرضع؛ ويرجع ذلك في غالب الأمر إلى ردة فعل الطفل تجاه الحقن و/ أو نتيجة الألم الناتج عن الحقن و/ أو نتيجة تعرضهم للموقف نفسه.
- يمكن أن يحدث رد الفعل التحسسي للتطعيم في حالات نادرة. وتحدث أغلب ردود الفعل التحسسية الخطيرة سريعًا بعد تلقي التطعيم. لذا، ينبغي أن يمكث الأطفال في عيادة الصحة العامة لما لا يقل عن 20 دقيقة بعد تلقي التطعيم.

سجل التطعيمات النرويجي SYSVAK

يُمكن الغرض من سجل التطعيمات النرويجي SYSVAK في الحفاظ على نظرة عامة عن حالة التطعيم الخاصة بالأفراد للمتابعة تغطية التطعيم على مستوى الدولة. وبالنسبة لخدمات الصحة العامة، يمثل السجل أداة لضمان تلقي جميع الأطفال عددًا مُرضيًا من التطعيمات.

يجب أن تسجل جميع التطعيمات التي يتم تلقيها في سجل التطعيمات النرويجي SYSVAK. وليس هناك أي احتمال لرفض تسجيل تطعيم تم تلقيه خلال برنامج تطعيم الطفولة. وبالنسبة للتطعيمات غير المسجلة الممنوحة سابقًا، يتم تسجيلها بأثر رجعي.

يتم تسجيل كل من: الاسم ورقم التعريف الشخصي النرويجي وأسماء التطعيمات الممنوحة، وتاريخ التطعيم، في سجل التطعيمات النرويجي SYSVAK. تخزن المعلومات بما يتلاءم مع القواعد السارية الخاصة بخصوصية الأفراد في دائرة الخدمة الصحية.