

درملنه 5-10 ورځې دوام کوي.

- هره ورځ په ورځ کې 2-3 ځله د پزې سورو په پای کې د باکټروبان (Bactroban) کریم پورې کړئ.
 - ټول بدن، پشمول د ویښتانو د هیبیسکرب (Hibiscrub) سره هره ورځ پرې مینځئ. په یاد ولرئ چې د گوتو مینځنو او پنډې هم پرې مینځئ. دغه صابون دوه ځله پرله پسې پورې کړئ.
 - ځان د پاک جان پاک سره وچ کړئ.
 - که چیرې MRSA په ستوني کې وموندل شي، نو لږترلږه په ورځ کې دوه ځله د کورسودیل (Corsodyl) سره غرغره وکړئ.
 - کالي، د تخت پوښونه او جان پاکونه هره ورځ بدل کړئ، او جان پاکونه او د تخت پوښونه په 60 درجو کې پرې مینځئ.
 - د رطوبت عادي کریمونه مه کاروئ - دا د هغه محصول تاثیر له مینځه وړي چې ستاسو درملنه ورباندې کېږي. درملتونونه ځانگړي کریمونه لري چې تاسو یې د وچ پوټکي لپاره کارولی شئ.
- عموما د ملهمو، پاکونکي توکو او د خولي مینځونکو لپاره باید ستاسو لخوا تادیه ونشي.

د درملني یا روغتیډو وروسته

د درملني بشپړیدو وروسته د کنټرول بیلگې یوه، دوه او درې اونيو کې اخیستل کېږي. بیلگې په ورته ډول لکه د لومړۍ ورځې په څیر اخیستل کېږي؛ په پزه، ستوني او پتون کې د کاتن مالوچ سره. وړاندیز کېږي چې د کنټرول بیلگې 3، 6 او 12 میاشتي وروسته واخیستل شي.

ځینې وختونه درملنه باید څو ځله تکرار شي مخکې لدې چې دغه باکټریا په بشپړ ډول له مینځه ولاړه شي.