AMHARISK



የኢንፍሉዌንዛ ክትባት 1-2-3

ማን መከተብ አለበት?

- አንዳንድ ሰዎች በኢንፍሉዌንዛ ምክንያት በጠና ይታመማሉ።
- ዕድሜያቸው ከ 65 ዓመት በላይ የሆኑ ሰዎች ሁሉ በየአመቱ ክትባት ቢወስዱ ይመረከራል።
- ሥር የሰደደ በሽታ ፣ ከመጠን በላይ ውፍረት ካለብዎት ወይም ነፍሰ ጡር ከሆኑ እርስዎም መከተብ አለብዎት።
- ዶክተርዎን ያነጋግሩ።

ክትባቱ እንዴት ይሠራል?

- ክትባቱ ሰውነቶ የኢንፍሉሉዌንዛ ቫይረስን መከላከል እንዲችል ያስተምረዋል።
- ክትባቱ በአንድ መጠን በመርፌ ይሰጣል።
- ክትባቱ መሥራት ለመጀመር ከ1-2 ሳምንታት ጊዜ ይወስዳል።



ከክትባት በኋላ

- ብዙ ሰዎች በተወጉበት ቦታ ላይ ትንሽ ህመም ሊሰማቸው ይችላል። በተጨማሪም ቦታው ሊቀላና ሊያብጥ ይችላል።
- አንዳንድ ሰዎች ትኩሳት ፣ የጡንቻ ህመም ወይም ትንሽ የህመም ስሜት ሊሰማቸው ይችላል።
- ይህ ከ 1-2 ቀናት በኋላ በራሱ ይጠፋል ።

NIPH
Norwegian Institute of Public Health

Helsedirektoratet
Norwegian Directorate of Health

ይህ የመረጃ ወረቀት ከታች ባለው ድረ ገፅ
መጫን ይችላል
WWW.FHI.NO/INFLUENSAVAKSINE
ILUSTRATION: RACECAR