

Tabell 4 Anbefaling om pneumokokkvaksine til eldre og risikogrupper

Risikogrupper	Pneumokokk polysakkaridvaksine (PPV23)	Pneumokokk konjugatvaksine (PKV)*
Dersom det er aktuelt å gi både PKV og PPV23, bør PKV gis først for å gi optimal immunrespons. Det bør gå minst 8 uker fra vaksinasjon med PKV til vaksinasjon med PPV23. For personer som tidligere er vaksinert med PPV23 og hvor det vurderes å være behov for PKV, bør intervallet mellom PPV og PKV være 1 år eller mer.		
Personer \geq 65 år uten andre risikofaktorer	PPV23 Revaksinasjon hvert 6. år Antistoffmåling ikke nødvendig	Ikke nødvendig
Personer med økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom (jfr tabell 3)	PPV23 Revaksinasjon hvert 6. år Antistoffmåling ikke nødvendig	Individuell vurdering Behov for PKV og valg av vaksintype vurderes ut fra antall risikotilstander og grad av risiko Personer < 18 år: 1 dose PKV13 Personer \geq 18 år: 1 dose PKV15 eller PKV20 Revaksinasjon ikke nødvendig
Grupper med spesielle anbefalinger		
Personer med anatomisk eller funksjonell miltmangel	PPV23 Revaksinasjon hvert 6. år Revaksinering kan vurderes etter kortere tid (3-5 år) på grunnlag av antistoffnivå i serum	Personer < 18 år: 1 dose PKV13 Personer \geq 18 år: 1 dose PKV 20 Revaksinasjon ikke nødvendig
Personer med stamcelletransplantasjon	PPV23 Revaksinasjon hvert 6. år Antistoffmåling er ikke nødvendig	Egne vaksineanbefalinger: Personer < 18 år: minst tre doser PKV13 Personer \geq 18 år: minst tre doser PKV20

*Personer som er tidligere vaksinert med PKV13 anbefales ikke PKV15 eller PKV20.

PPV23: 23-valent pneumokokkpolysakkaridvaksine, PKV: 13-, 15-, eller 20-valent pneumokokkonjugatvaksine