

Tabell: Oppsummering av gjeldende vaksineanbefalinger i ulike grupper

Hvem	Grunnvaksinasjon			Oppfriskningsdose		Merknad
	Vaksine	Antall doser	Intervall	Vaksine	Minimums-intervall	
Barn under 5 år	-	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koronavaksinene er ikke godkjent for barn under 5 år.</li> </ul>
5-11 år (årskull 2010-2016 og barn født i 2017 som har fylt 5 år)	Comirnaty 10 µg/dose  (Egen barneformulering med <b>oransje</b> plastlokk på hetteglass. Barn som har fylt 12 år kan få Comirnaty 30 µg/dose)	1 eller 2	8–12 uker	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kan vaksineres med 1 eller 2 doser dersom foresatte ønsker det.</li> <li>Vaksinasjon er mest aktuelt for: <ul style="list-style-type: none"> <li>Barn med kroniske sykdommer (samme gruppe som anbefales influensavaksine)</li> <li>Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse</li> <li>Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon</li> </ul> </li> <li>Dersom barn vaksineres, vurderes én dose å ha best nytte-ulempebalanse</li> <li>Gjennomgått covid-19 regnes som en immunologisk hendelse og reduserer behovet for vaksinedoser.</li> </ul>
5–11 år med alvorlig grunnsykdom (årskull 2010-2016 og barn født i 2017 som har fylt 5 år)	Comirnaty 10 µg/dose  (Egen barneformulering med <b>oransje</b> plastlokk på hetteglass. Barn som har fylt 12 år kan få Comirnaty 30 µg/dose)	2	8–12 uker	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bør grunnvaksineres med 2 doser. Personer med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 doser.</li> <li>Tilpasset vaksinasjonsregime (ned til 3 ukers intervall) er aktuelt for noen barn med alvorlig grunnsykdom, basert på legevurdering.</li> </ul>

**Tabell: Oppsummering av gjeldende vaksineanbefalinger i ulike grupper**

Hvem	Grunnvaksinasjon			Oppfriskningsdose		Merknad
	Vaksine	Antall doser	Intervall	Vaksine	Minimumsintervall	
<b>12–15 år (årskull 2006-2009)</b>	Comirnaty	1 eller 2	8–12 uker	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kan vaksineres med 1 eller 2 doser dersom foresatte/barnet selv ønsker det.</li> <li>• Gjennomgått covid-19 regnes som en immunologisk hendelse og reduserer behovet for vaksinedoser.</li> </ul>
<b>12–15 år med alvorlig grunnsykdom (årskull 2006-2009)</b>	Comirnaty	2	8–12 uker	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bør grunnvaksineres med 2 doser. Personer med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 doser.</li> <li>• Tilpasset vaksinasjonsregime er aktuelt for noen, basert på legevurdering. Minimumsintervall på 3 uker mellom doser må overholdes.</li> <li>• De som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales 1 dose koronavaksine.</li> </ul>
<b>16–17 år (årskull 2004, 2005)</b>	Comirnaty	2	8–12 uker	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bør grunnvaksineres med 2 doser. Personer med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 doser.</li> <li>• Personer vaksinert med Spikevax som dose 1, bør tilbys Comirnaty som dose 2.</li> <li>• De som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales 1 dose koronavaksine.</li> <li>• Personer født i 2004 som har fylt 18 år kan ta oppfriskningsdose hvis de ønsker</li> </ul>

**Tabell: Oppsummering av gjeldende vaksineanbefalinger i ulike grupper**

Hvem	Grunnvaksinasjon			Oppfriskningsdose		Merknad
	Vaksine	Antall doser	Intervall	Vaksine	Minimumsintervall	
<b>18–44 år</b>	Comirnaty eller Spikevax	2	Comirnaty 3–12 uker  Spikevax 4–12 uker	Comirnaty full dose eller Spikevax halv dose	20 uker	<ul style="list-style-type: none"> <li>Personer under 30 år bør tilbys Comirnaty.</li> <li>Oppfriskningsdose anbefales til alle mellom 18 og 44 år med underliggende sykdommer/helsetilstander som gir økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. I tillegg er det også åpnet opp for at øvrige i aldersgruppen 18-44 år kan få oppfriskningsdose.</li> </ul>
<b>Ved alvorlig svekket immunforsvar ≥18 år</b>	Comirnaty eller Spikevax	3	Comirnaty 3 uker  Spikevax 4 uker	Comirnaty full dose eller Spikevax halv dose	3 md	<ul style="list-style-type: none"> <li>Personer under 30 år bør tilbys Comirnaty.</li> <li>Behov for ytterligere vaksinasjon utover de 4 anbefalte dosene til de med mest svekket immunforsvar må vurderes individuelt, primært av sykehusspesialist.</li> </ul>
<b>Ved høy risiko for alvorlig sykdomsforløp (prioriteringsgruppe 4, unntatt de med alvorlig svekket immunforsvar)</b>	Comirnaty eller Spikevax	2	Comirnaty 3–12 uker  Spikevax 4–12 uker	Comirnaty full dose eller Spikevax halv dose	20 uker	<ul style="list-style-type: none"> <li>Personer under 30 år bør tilbys Comirnaty.</li> </ul>

**Tabell: Oppsummering av gjeldende vaksineanbefalinger i ulike grupper**

Hvem	Grunnvaksinasjon			Oppfriskningsdose		Merknad
	Vaksine	Antall doser	Intervall	Vaksine	Minimumsintervall	
45–64 år	Comirnaty eller Spikevax	2	Comirnaty 3–12 uker  Spikevax 4–12 uker	Comirnaty full dose eller Spikevax halv dose	20 uker	
≥65 år	Comirnaty eller Spikevax	2	Comirnaty 3–12 uker  Spikevax 4–12 uker	Comirnaty full dose eller Spikevax halv dose	20 uker	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koronavaksine og influensavaksine kan gis samtidig. Samvaksinerer bør imidlertid unngås hos skrøpelige pasienter og ved bruk av adjuvantert influensavaksine (Fluad Tetra).</li> <li>• Personer 65 år og eldre og sykehjemsboere anbefales ny oppfriskningsdose (dose 4). Intervall siden forrige dose bør være minst 4 md.</li> </ul>
<b>Alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten</b>	Comirnaty eller Spikevax	2	Comirnaty 3–12 uker  Spikevax 4–12 uker	Comirnaty full dose eller Spikevax halv dose	20 uker	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personer under 30 år bør tilbys Comirnaty.</li> </ul>
<b>Gravide</b>	Comirnaty eller Spikevax	2	Comirnaty 3–8 uker  Spikevax 4–8 uker	Comirnaty full dose eller Spikevax halv dose	20 uker	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grunnvaksinasjon anbefales uavhengig av trimester</li> <li>• Oppfriskningsdose er særlig viktig for gravide i 2. og 3. trimester om det har gått mer enn 20 uker siden dose 2, og i første trimester dersom det foreligger tilleggssykdom hos den gravide.</li> <li>• Personer under 30 år bør tilbys Comirnaty.</li> </ul>

Vaksinen Nuvaxovid er tilgjengelig i Koronavaksinasjonsprogrammet. For mer informasjon om bruk se [Vaksinasjonsveilederen](#).