

Tabell: Oppsummering av gjeldende vaksineanbefalinger i ulike grupper

Hvem	Primærvaksinasjon			Oppfriskningsdose		Merknad
	Vaksine	Antall doser	Intervall	Vaksine	Minimumsintervall	
<12 år			-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Koronavaksinene for barn under 12 år er ikke en del av koronavaksinasjonsprogrammet
12-15 år (Født i 2006, 2007 og 2008, samt de som har fylt 12 år i årskull 2009)	Comirnaty	1	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Enkelte kan etter vurdering av lege tilbys 2 doser. Det kan for eksempel gjelde de som bor sammen med spesielt sårbare personer eller som har annen særskilt tilleggsrisiko. De som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales foreløpig ikke vaksinerings.
12-15 år med alvorlig grunnsykdom	Comirnaty	2	8-12 uker	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Tilpasset vaksinasjonsregime er aktuelt for noen, basert på legevurdering. Minimumsintervall mellom doser må overholdes. De som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales 1 dose koronavaksine
16-17 år	Comirnaty	2	8-12 uker	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Personer vaksinert med Spikevax som dose 1, bør tilbys Comirnaty som dose 2 De som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales 1 dose koronavaksine
18-44 år	Comirnaty eller Spikevax	2	Comirnaty 3-12 uker Spikevax 4-12 uker	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Menn under 30 år anbefales å vurdere å velge Comirnaty De som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales 1 dose koronavaksine

Tabell: Oppsummering av gjeldende vaksineanbefalinger i ulike grupper

Hvem	Primærvaksinasjon			Oppfriskningsdose		Merknad
	Vaksine	Antall doser	Intervall	Vaksine	Minimumsintervall	
Gravide	Comirnaty eller Spikevax	2	Comirnaty 3-8 uker Spikevax 4-8 uker	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Vaksinering anbefales i 2. og 3. trimester med mindre det er risikofaktorer hos mor eller stor smitterisiko som tilsier vaksinasjon i 1. trimester.
45-64 år	Comirnaty eller Spikevax	2	Comirnaty 3-12 uker Spikevax 4-12 uker	Comirnaty full dose eller Spikevax halv dose	20 uker	
≥65 år	Comirnaty eller Spikevax	2	Comirnaty 3-12 uker Spikevax 4-12 uker	Comirnaty full dose eller Spikevax halv dose	20 uker	<ul style="list-style-type: none"> Koronavaksine og influensavaksine bør ikke gis samtidig, og det bør være et intervall på minst én uke mellom de to vaksinene
Alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten	Comirnaty eller Spikevax	2	Comirnaty 3-12 uker Spikevax 4-12 uker	Comirnaty full dose eller Spikevax halv dose	20 uker	<ul style="list-style-type: none"> Gravid helsepersonell som selv ønsker vaksinasjon med en oppfriskningsdose fordi de jobber med pasienter, vil ha mulighet til å få dette på lik linje med ikke-gravid helsepersonell. Gravid helsepersonell som ikke ønsker oppfriskningsdose, må respekteres for et slikt valg. Menn under 30 år anbefales å vurdere å velge Comirnaty

Tabell: Oppsummering av gjeldende vaksineanbefalinger i ulike grupper

Hvem	Primærvaksinasjon			Oppfriskningsdose		Merknad
	Vaksine	Antall doser	Intervall	Vaksine	Minimums-intervall	
Ved alvorlig svekket immunforsvar ≥ 18 år	Comirnaty eller Spikevax	3	Comirnaty 3 uker Spikevax 4 uker	Comirnaty full dose eller Spikevax halv dose	3 md	<ul style="list-style-type: none"> • Det er i utgangspunktet ikke grunnlag for å anbefale 3. dose til barn og unge (12 år til og med 17 år) med alvorlig svekket immunforsvar på gruppenivå, men det kan likevel være enkelte pasienter der dette vurderes som nødvendig. Slike beslutninger bør foretas av barnelege. • Menn under 30 år anbefales å vurdere å velge Comirnaty
Ved høy risiko for alvorlig sykdomsforløp (prioriteringsgruppe 4, unntatt de med alvorlig svekket immunforsvar)	Comirnaty eller Spikevax	2	Comirnaty 3-12 uker Spikevax 4-12 uker	Comirnaty full dose eller Spikevax halv dose	20 uker	<ul style="list-style-type: none"> • Menn under 30 år anbefales å vurdere å velge Comirnaty