

Tabell: Oppsummering av gjeldende vaksineanbefalinger i ulike grupper

Hvem	Primærvaksinasjon			Oppfriskningsdose		Merknad
	Vaksine	Antall doser	Intervall	Vaksine	Minimumsintervall	
Barn under 5 år						<ul style="list-style-type: none"> Koronavaksinene er ikke godkjent for barn under 5 år
5-11 år med alvorlig grunnsykdom	Comirnaty (Egen barneformulering med oransje plastlokk på hetteglass)	2	8-12 uker	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Tilpasset vaksinasjonsregime (ned til 3 ukers intervall) er aktuelt for noen barn med alvorlig grunnsykdom, basert på legevurdering. Enkelte friske barn som for eksempel bor sammen med spesielt sårbare personer eller som har annen særskilt tilleggssisiko kan også tilbys vaksine etter vurdering av lege.
12-15 år (Født i 2006, 2007 og 2008, samt de som har fylt 12 år i årskull 2009)	Comirnaty	1	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Enkelte kan etter vurdering av lege tilbys 2 doser. Det kan for eksempel gjelde de som bor sammen med spesielt sårbare personer eller som har annen særskilt tilleggssisiko. De som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales foreløpig ikke vaksiner.

Tabell: Oppsummering av gjeldende vaksineanbefalinger i ulike grupper

Hvem	Primærvaksinasjon			Oppfriskningsdose		Merknad
	Vaksine	Antall doser	Intervall	Vaksine	Minimumsintervall	
12-15 år med alvorlig grunnsykdom	Comirnaty	2	8-12 uker	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Tilpasset vaksinasjonsregime er aktuelt for noen, basert på legevurdering. Minimumsintervall mellom doser må overholdes. De som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales 1 dose koronavaksine
16-17 år	Comirnaty	2	8-12 uker	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Personer vaksinert med Spikevax som dose 1, bør tilbys Comirnaty som dose 2 De som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales 1 dose koronavaksine
18-44 år	Comirnaty eller Spikevax	2	Comirnaty 3-12 uker Spikevax 4-12 uker	Comirnaty full dose eller Spikevax halv dose	20 uker	<ul style="list-style-type: none"> Menn under 30 år anbefales å vurdere å velge Comirnaty
Gravide	Comirnaty eller Spikevax	2	Comirnaty 3-8 uker Spikevax 4-8 uker	Comirnaty full dose eller Spikevax halv dose	20 uker	<ul style="list-style-type: none"> Vaksinering anbefales i 2. og 3. trimester med mindre det er risikofaktorer hos mor eller stor smitterisiko som tilsier vaksinasjon i 1. trimester.
45-64 år	Comirnaty eller Spikevax	2	Comirnaty 3-12 uker Spikevax 4-12 uker	Comirnaty full dose eller Spikevax halv dose	20 uker	

Tabell: Oppsummering av gjeldende vaksineanbefalinger i ulike grupper

Hvem	Primærvaksinasjon			Oppfriskningsdose		Merknad
	Vaksine	Antall doser	Intervall	Vaksine	Minimumsintervall	
≥65 år	Comirnaty eller Spikevax	2	Comirnaty 3-12 uker Spikevax 4-12 uker	Comirnaty full dose eller Spikevax halv dose	20 uker	<ul style="list-style-type: none"> Koronavaksine og influensavaksine kan gis samtidig. Samvaksinering bør imidlertid unngås hos skrøpelige pasienter og ved bruk av adjuvantert influensavaksine (Fluad Tetra)
Alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten	Comirnaty eller Spikevax	2	Comirnaty 3-12 uker Spikevax 4-12 uker	Comirnaty full dose eller Spikevax halv dose	20 uker	<ul style="list-style-type: none"> Menn under 30 år anbefales å vurdere å velge Comirnaty
Ved alvorlig svekket immunforsvar ≥18 år	Comirnaty eller Spikevax	3	Comirnaty 3 uker Spikevax 4 uker	Comirnaty full dose eller Spikevax halv dose	3 md	<ul style="list-style-type: none"> Det er i utgangspunktet ikke grunnlag for å anbefale 3. dose til barn og unge (12 år til og med 17 år) med alvorlig svekket immunforsvar på gruppenivå, men det kan likevel være enkelte pasienter der dette vurderes som nødvendig. Slike beslutninger bør foretas av barnelege. Menn under 30 år anbefales å vurdere å velge Comirnaty

Tabell: Oppsummering av gjeldende vaksineanbefalinger i ulike grupper

Hvem	Primærvaksinasjon			Oppfriskningsdose		Merknad
	Vaksine	Antall doser	Intervall	Vaksine	Minimumsintervall	
Ved høy risiko for alvorlig sykdomsforløp (prioriteringsgruppe 4, unntatt de med alvorlig svekket immunforsvar)	Comirnaty eller Spikevax	2	Comirnaty 3-12 uker Spikevax 4-12 uker	Comirnaty full dose eller Spikevax halv dose	20 uker	<ul style="list-style-type: none"> Menn under 30 år anbefales å vurdere å velge Comirnaty