

Tabell: Oppsummering av gjeldende vaksineanbefalinger i ulike grupper

Hvem	Grunnvaksinasjon			Oppfriskningsdose		Merknad
	Vaksine	Antall doser	Intervall	Vaksine	Minimums-intervall	
Barn under 5 år	-	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Koronavaksinene er ikke godkjent for barn under 5 år.
5-11 år (årskull 2010-2016 og barn født i 2017 som har fylt 5 år)	Comirnaty 10 µg/dose (Egen barneformulering med oransje plastlokk på hetteglass. Barn som har fylt 12 år kan få Comirnaty 30 µg/dose)	1 eller 2	8–12 uker	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Kan vaksineres med 1 eller 2 doser dersom foresatte ønsker det. Vaksinasjon er mest aktuelt for: <ul style="list-style-type: none"> Barn med kroniske sykdommer (samme gruppe som anbefales influensavaksine) Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon Dersom barn vaksineres, vurderes én dose å ha best nytte-ulempebalanse Gjennomgått covid-19 regnes som en immunologisk hendelse og reduserer behovet for vaksinedoser.
5–11 år med alvorlig grunnsykdom (årskull 2010-2016 og barn født i 2017 som har fylt 5 år)	Comirnaty 10 µg/dose (Egen barneformulering med oransje plastlokk på hetteglass. Barn som har fylt 12 år kan få Comirnaty 30 µg/dose)	2	8–12 uker	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Bør grunnvaksineres med 2 doser. Personer med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 doser. Tilpasset vaksinasjonsregime (ned til 3 ukers intervall) er aktuelt for noen barn med alvorlig grunnsykdom, basert på legevurdering.

Tabell: Oppsummering av gjeldende vaksineanbefalinger i ulike grupper

Hvem	Grunnvaksinasjon			Oppfriskningsdose		Merknad
	Vaksine	Antall doser	Intervall	Vaksine	Minimumsintervall	
12–15 år (årskull 2006-2009)	Comirnaty	1 eller 2	8–12 uker	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Kan vaksineres med 1 eller 2 doser dersom foresatte/barnet selv ønsker det. • Gjennomgått covid-19 regnes som en immunologisk hendelse og reduserer behovet for vaksinedoser.
12–15 år med alvorlig grunnsykdom (årskull 2006-2009)	Comirnaty	2	8–12 uker	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Bør grunnvaksineres med 2 doser. Personer med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 doser. • Tilpasset vaksinasjonsregime er aktuelt for noen, basert på legevurdering. Minimumsintervall på 3 uker mellom doser må overholdes. • De som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales 1 dose koronavaksine.
16–17 år (årskull 2004, 2005)	Comirnaty	2	8–12 uker	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Bør grunnvaksineres med 2 doser. Personer med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 doser. • Personer vaksinert med Spikevax som dose 1, bør tilbys Comirnaty som dose 2. • De som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales 1 dose koronavaksine. • Personer født i 2004 som har fylt 18 år kan ta oppfriskningsdose hvis de ønsker

Tabell: Oppsummering av gjeldende vaksineanbefalinger i ulike grupper

Hvem	Grunnvaksinasjon			Oppfriskningsdose		Merknad
	Vaksine	Antall doser	Intervall	Vaksine	Minimumsintervall	
18–44 år	Comirnaty eller Spikevax	2	Comirnaty 3–12 uker Spikevax 4–12 uker	Comirnaty full dose eller Spikevax halv dose	20 uker	<ul style="list-style-type: none"> Personer under 30 år bør tilbys Comirnaty. Oppfriskningsdose anbefales til alle mellom 18 og 44 år med underliggende sykdommer/helsetilstander som gir økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. I tillegg er det også åpnet opp for at øvrige i aldersgruppen 18-44 år kan få oppfriskningsdose.
Ved alvorlig svekket immunforsvar ≥18 år	Comirnaty eller Spikevax	3	Comirnaty 3 uker Spikevax 4 uker	Comirnaty full dose eller Spikevax halv dose	3 md	<ul style="list-style-type: none"> Personer under 30 år bør tilbys Comirnaty. Behov for ytterligere vaksinasjon utover de 4 anbefalte dosene til de med mest svekket immunforsvar må vurderes individuelt, primært av sykehusspesialist.
Ved høy risiko for alvorlig sykdomsforløp (prioriteringsgruppe 4, unntatt de med alvorlig svekket immunforsvar)	Comirnaty eller Spikevax	2	Comirnaty 3–12 uker Spikevax 4–12 uker	Comirnaty full dose eller Spikevax halv dose	20 uker	<ul style="list-style-type: none"> Personer under 30 år bør tilbys Comirnaty.

Tabell: Oppsummering av gjeldende vaksineanbefalinger i ulike grupper

Hvem	Grunnvaksinasjon			Oppfriskningsdose		Merknad
	Vaksine	Antall doser	Intervall	Vaksine	Minimums-intervall	
45–64 år	Comirnaty eller Spikevax	2	Comirnaty 3–12 uker Spikevax 4–12 uker	Comirnaty full dose eller Spikevax halv dose	20 uker	
≥65 år	Comirnaty eller Spikevax	2	Comirnaty 3–12 uker Spikevax 4–12 uker	Comirnaty full dose eller Spikevax halv dose	20 uker	<ul style="list-style-type: none"> • Koronavaksine og influensavaksine kan gis samtidig. Samvaksinerings bør imidlertid unngås hos skrøpelige pasienter og ved bruk av adjuvantert influensavaksine (Fluad Tetra). • Personer 80 år og eldre kan tilbys en 2.oppfriskningsdose (dose 4) dersom de selv ønsker det og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dose 3. Intervall mellom dose 3 og 4 bør være minst 4 md.
Alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten	Comirnaty eller Spikevax	2	Comirnaty 3–12 uker Spikevax 4–12 uker	Comirnaty full dose eller Spikevax halv dose	20 uker	<ul style="list-style-type: none"> • Personer under 30 år bør tilbys Comirnaty.
Gravide	Comirnaty eller Spikevax	2	Comirnaty 3–8 uker Spikevax 4–8 uker	Comirnaty full dose eller Spikevax halv dose	20 uker	<ul style="list-style-type: none"> • Grunnvaksinasjon anbefales uavhengig av trimester • Oppfriskningsdose er særlig viktig for gravide i 2. og 3. trimester om det har gått mer enn 20 uker siden dose 2, og i første trimester dersom det foreligger tilleggssykdom hos den gravide. • Personer under 30 år bør tilbys Comirnaty.

Vaksinen Nuvaxovid er tilgjengelig i Koronavaksinasjonsprogrammet. For mer informasjon om bruk se [Vaksinasjonsveilederen](#).