



Vaccin contre le coronavirus pour les enfants de 5 à 11 ans

Brèves informations de l'Institut norvégien de santé publique sur le vaccin contre le Covid-19




Maladie à coronavirus

- Le coronavirus est très rarement dangereux pour les enfants.
- Cependant, le vaccin peut être utile chez certains enfants.
- Avoir contracté le Covid-19 protège au moins aussi bien que le vaccin contre une nouvelle infection.




À propos de la vaccination

- Si vous et vos parents/tuteurs le souhaitez, vous pouvez recevoir 1 ou 2 doses de vaccin contre le Covid-19.
- La vaccination est facultative.
- Le vaccin est administré à l'aide d'une seringue dans la partie supérieure du bras.
- Si vous avez peur des piqûres, n'hésitez pas à le signaler afin que la personne qui vaccine puisse faire particulièrement attention.
- Si vous choisissez 2 doses, il est préférable de prévoir 8 à 12 semaines entre les doses.




Quelle est l'efficacité du vaccin ?

- Les enfants sont bien protégés contre les formes graves du Covid-19 au bout de 3 semaines après la première dose.
- Vous pouvez être contaminé et contaminer d'autres personnes même si vous avez été vacciné.
- Respectez les conseils de protection contre les infections même si vous êtes vacciné.



Comment agit le vaccin ?

- Le vaccin apprend au corps à reconnaître le coronavirus et à vous protéger de la maladie.
- Le corps se souvient comment il peut vous défendre contre le virus.



Effets secondaires courants

Vous pouvez avoir des réactions après le vaccin. C'est ce qu'on appelle des effets secondaires. Les plus courants sont :

- Douleur au point d'injection
- Fatigue
- Maux de tête
- Douleurs dans le corps
- Frissons et fièvre

En général, ils disparaissent en quelques jours.



Effets secondaires inhabituels

- Les effets secondaires graves sont très rares.
- Les effets secondaires rares comme des réactions allergiques et une myocardite peuvent être traités.
- Nous surveillons de près l'apparition de nouveaux effets secondaires.
- Contactez le médecin, une infirmière en santé publique ou un autre professionnel de santé si l'enfant a des symptômes inhabituels, violents ou de longue durée après la vaccination.



[Télécharger le
formulaire de
consentement ici](#)

Les parents/tuteurs doivent donner leur approbation (consentement) à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. La vaccination est gratuite. Consultez le site Internet de votre commune pour savoir comment obtenir un rendez-vous. En savoir plus sur www.fhi.no/kvp