



Voksenvaksinasjonsprogrammet


Webinar for fastleger

04.09.2025

Agenda

- Medisinske anbefalinger versus vaksiner i vokseenvaksinasjonsprogram
- Egenbetaling og oppgjørsordning
- Kort om vaksinebestilling og distribusjon
- Påminnelsesordning
- Kommunikasjonsplan og materiell
- Tips

Flytskjema for vaksinering av voksne og risikogrupper



Inflensavaksine

Voksenvaksinasjonsprogrammet omfatter – risikogrupper

- Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
- Aldersgruppen 65 år og eldre
- Barn og voksne med definerte risikotilstander og sykdommer
- Gravide etter 12. svangerskapsuke, samt alle gravide som inngår i risikogruppe
- Prematurt fødte barn fra 6 måneder til 5 års alder

Vaksine i program: Influvac, Vaxigrip, Fluad (50+), Fluenz (2-17 år)

Rekvireringsrett i program: Lege, helsesykepleier, farmasøyt i apotek og sykepleier

Betaling for vaksiner i program: Beskrevet i [veileder til vaksinasjonsforskrift](#)

Inflensavaksine

Anbefalinger **utenom** vokseenvaksinasjonsprogrammet:

- Husstandskontakter til immunsupprimerte
- Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter
- Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
- Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasjuk tamfugl

Vaksine utenom program: Influvac, Vaxigrip, Fluarix, Fluenz, Efluelda (bare i apotek)

Rekvireringsrett utenom program: Lege og farmasøyt (i apotek og kun de 3 første vaksinene)

Betaling for anbefalt vaksinerings utenom program: Yrkesvaksinerings betales av arbeidsgiver.

Egenbetaling for husstandskontakter, ingen veiledende sats

Pneumokokkvaksine

Voksenvaksinasjonsprogrammet omfatter:

- Personer født i 1960 eller senere fra det kalenderåret de fyller 65 år
 - 2025: kun personer født i 1960
 - 2026: personer født i 1961 og fortsatt uvaksinerte personer født i 1960
- Uvaksinerte personer født i 1960 (65 år i år) vil få påminnelse i midten av november
- Retten til å motta pneumokokkvaksine gjennom voksenvaksinasjonsprogrammet består selv om man ikke benytter seg av tilbudet det året man fyller 65 år.

Tidligere fått Pneumovax?

Vaksiner med Prevenar 20 etter 5-6 år, minimumsintervall ett år

Vaksine i program: Prevenar 20

Rekvireringsrett i program: Lege og helsesykepleier

Betaling for vaksiner i program: Beskrevet i [veileder til vaksinasjonsforskrift](#)

Pneumokokkvaksine

Medisinske anbefalinger **utenom** vokseenvaksinasjonsprogrammet:

- Aldersgruppen over 66 år
- Personer med definerte risikotilstander og sykdommer

Vaksine utenom program: Pneumovax, Prevenar 20, Capvaxive

Rekvireringsrett utenom program: **Kun** lege

Betaling for vaksinerings utenom program: Egenbetaling, ingen veiledende sats – noen få grupper kan få gratis vaksine på blåresept §4

Koronavaksine

Voksenvaksinasjonsprogrammet omfatter:

Anbefalt vaksine:

- Personer i omsorgsboliger og sykehjem
- Aldersgruppen 75 år og eldre
- Aldersgruppen 18-74 år med definerte risikotilstander og sykdommer
- Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom
- Aldersgruppen 6 måneder – 11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering

Ikke anbefalt vaksine, men likevel inkludert i program:

- Aldersgruppen 65-74 år

OBS:

Friske gravide og spebarn har lav forekomst av alvorlig covid-19, gravide er **ikke lenger anbefalt vaksine**.

OBS:

Personer **uten tillegg**risiko under 75 år har nå lav forekomst av alvorlig covid-19, og er **ikke lenger anbefalt vaksine**.

Vaksine i program: Comirnaty LP.8.1 (flerdose hetteglass)

Rekvireringsrett i program: Lege, helsesykepleier, farmasøyt og sykepleier

Betaling for vaksiner i program: Beskrevet i [veileder til vaksinasjonsforskrift](#)

Koronavaksine

Medisinske anbefalinger **utenom** program:

Husstandskontakter til immunsupprimerte

OBS! Ikke omfattet av vokseenvaksinasjonsprogrammet og må betale full pris for vaksine og vaksinasjon.

Vaksine utenom program: Comirnaty LP.8.1

Rekvireringsrett utenom program: **Kun** lege

Betaling for vaksinerings utenom program: Egenbetaling, ingen veiledende sats

Fra 1.september 2025 vil det komme en kommersiell pakning på markedet - Comirnaty *ferdigfylte én-dose sprøyter* i 10-pakninger. Det er opplyst at apotekene vil ta inn disse via sin apotekgrossist. FHI har ikke disse vaksinene.

Forutsatt at vaksinene er tilgjengelige på apotek er kommunene oppfordret til å henvise personer som ønsker vaksinerings utenfor program til fastlege for resept, slik at de kan vaksineres på apotek eller hos lege.

Samvaksining

- Nesten alle vaksinene som er inkludert i program kan gis samtidig eller med hvilket som helst intervall.
- Unntaket er **adjuvantert influensavaksine - Fluad** - til særskilt skrøpelige eldre som ikke bør settes sammen med de andre vaksinene.
- Dersom vaksinene gis samtidig anbefales det at de settes med minst 2,5 cm avstand for lettere å kunne skille bivirkninger



Egenbetaling og oppgjørsordning

Anne Kjersti Røise, Helsedirektoratet

Veileder til forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram

Helsedirektoratet har ansvar for [veileder til forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram](#)

- Første versjon ble publisert i juli og ligger tilgjengelig på Helsedirektoratets nettside

Veilederen har kommunene som målgruppe og inneholder blant annet

- veiledende satser for egenbetaling i vokseenvaksinasjonsprogrammet
- veiledende satser for kompensasjon til private vaksinatører for gjennomført vaksinasjon
- krav og føringer for bruk av nasjonal oppgjørsløsning

Veilederen oppdateres med presiseringer om nasjonal oppgjørsløsning nå i september.

Veileder til forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram

Veiledende satser

Helsedirektoratet gir veiledende satser. Den enkelte kommune er selv ansvarlig for å fastsette de satsene som skal gjelde i sin kommune.

Takst-kode	Type vaksinasjon	Egenbetaling innbygger (kroner)	Refusjon fra kommune (kroner)	Kompensasjon til private vaksinatører (kroner)
pvc	Programvaksine mot covid-19	110	130	240
pvcs	Programvaksine mot covid-19 - samvaksinasjon	85	155	240
pvp	Programvaksine mot pneumokokksykdom	110	90	200
pvps	Programvaksine mot pneumokokksykdom - samvaksinasjon	85	115	200
pvi	Programvaksine mot sesonginfluensa	301*	0	200
pvk	Programvaksine mot kikhoste	0	0	0

*inkluderer kostnad for vaksinen (101 kroner)

Veileder til forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram

Oppgjør mellom private vaksinatører og kommuner

- En avtale mellom en kommune og en privat vaksinatør må blant annet regulere
 - hvilke vaksinasjoner vaksinatøren kan gjennomføre
 - satser for egenbetaling og satser for kompensasjon til vaksinatør
 - hvilken oppgjørsløsning som skal benyttes
- Det tilbys bruk av en nasjonal oppgjørsløsning for oppgjør i vaksinasjonsprogram fra 1. oktober. Krav til vaksinatøren og kommunen framgår av veilederen.
 - Kun fastleger og private vaksineklinikker kan benytte en nasjonal oppgjørsløsning inntil videre.
 - Bruk av den nasjonale oppgjørsløsningen forutsetter at kommunen og vaksinatøren har avtalt å bruke de veiledende satsene som framgår av veilederen.

Veileder til forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram

Eksempel på krav

1. Innbygger får ordinert og satt vaksine mot sesonginfluensa hos fastlege med avtale

Takstkode	Type vaksinasjon	Kompensasjon vaksinatører	Egenbetaling	Refusjon fra kommune
pvi	Programvaksine mot sesonginfluensa	200	301*	0

*inkluderer kostnad for vaksinen (101 kroner)

2. Innbygger får ordinert og satt vaksine mot pneumokokksykdom hos fastlege med avtale

Takstkode	Type vaksinasjon	Kompensasjon vaksinatører	Egenbetaling	Refusjon fra kommune
pvp	Programvaksine mot pneumokokksykdom	200	110	90

3. Innbygger får ordinert og satt vaksine mot covid-19 hos fastlege med avtale

Takstkode	Type vaksinasjon	Kompensasjon vaksinatører	Egenbetaling	Refusjon fra kommune
pvc	Programvaksine mot covid-19	240	110	130

Veileder til forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram

Eksempel på krav

4. Innbygger får ordinert og satt vaksine mot sesonginfluensa og pneumokokksykdom hos fastlege med avtale

Takstkode	Type vaksinasjon	Kompensasjon vaksinatører	Egenbetaling	Refusjon fra kommune
pvi	Programvaksine mot sesonginfluensa	200	301*	0
pvps	Programvaksine mot pneumokokksykdom - samvaksinasjon	200	85	115
Totalt		400	386	115

5. Innbygger får ordinert og satt vaksine mot covid-19 og pneumokokksykdom hos fastlege med avtale

Takstkode	Type vaksinasjon	Kompensasjon vaksinatører	Egenbetaling	Refusjon fra kommune
pvcs	Programvaksine mot covid-19 - samvaksinasjon	240	85	155
pvps	Programvaksine mot pneumokokksykdom - samvaksinasjon	200	85	115
Totalt		440	170	270

6. Innbygger får ordinert og satt vaksine mot covid-19, pneumokokksykdom og sesonginfluensa hos fastlege med avtale

Takstkode	Type vaksinasjon	Kompensasjon vaksinatører	Egenbetaling	Refusjon fra kommune
pvcs	Programvaksine mot covid-19 - samvaksinasjon	240	85	155
pvps	Programvaksine mot pneumokokksykdom - samvaksinasjon	200	85	115
pvi	Programvaksine mot sesonginfluensa	200	301*	0
Totalt		640	471	270

*inkluderer kostnad for vaksinen (101 kroner)



Kort om bestilling og distribusjon av vaksiner til vokseenvaksinasjonsprogrammet

Bestilling av korona- og pneumokokkvaksine til vokseenvaksinasjonsprogram

Kommunens ansvar å bestille (tilgangsbegrensning i FHIs nettbutikk)

- Korona- og pneumokokkvaksiner sendes nå ut fortløpende fra FHI basert på kommunens bestilling
- Kun én leveringsadresse per kommune

Influensavaksine – distribusjon

- Hovedutsending av sesongens forhåndsbestilte doser i uke 40-42
 - Forhåndsbestilte doser vil bli levert etter følgende plan:
 - Uke 40: Nord-Norge, Svalbard, Østlandet
 - Uke 41: Trøndelag, Møre og Romsdal
 - Uke 42: Vestland, Rogaland, Agder
- Forsinkede bestillinger og etterbestillinger leveres fra ca. uke 43
- Influensavaksinen er holdbar til forsommeren etter endt sesong – husk å rydde fra i fjor før årets vaksine kommer!

Påminnelser om vaksinasjon

- Påminnelsesordning
 - Basert på aldersindikasjon for vaksine mot de ulike sykdommene
 - Lanseres midt i uke 47 (onsdag 19. november), via Helsenorge
 - Påminnelse til personer som *ikke* er vaksinert på det tidspunktet
 - Mulig å reservere seg
- InFLUnudge - forskningsprosjekt ved Folkehelseinstituttet
 - Undersøke effekten av å sende påminnelses-SMS om influensavaksinering på norsk, ukrainsk eller polsk.
 - SMS til anslagsvis 4.000 med polsk bakgrunn, 4.000 med ukrainsk bakgrunn og 24.000 med norsk bakgrunn. Alle SMS'er vil bli sendt ut på samme dag i uke 42.

Kommunikasjonsmaterieil

- Ny temaside for befolkningen på fhi.no: [Vaksiner til voksne](https://fhi.no/vaksiner-til-voksne)
- Nytt innhold på helsenorge.no

- Informasjonsark
- Informasjonsflyer
- Plakater

- Språk:
 - Bokmål
 - Nynorsk
 - Samisk
 - Engelsk
 - Arabisk
 - Urdu
 - Ukrainsk
 - Polsk

Vaksiner til voksne | Bokmål - utgitt 2025

Vaksine mot pneumokokksjukdom

Pneumokokkar er ein bakterie som kan gje lungebetennelse, øyrebetennelse eller biholebetennelse, men også alvorleg sjukdom som blodforgifting eller hjernehinnebetennelse med høg dødelegheit.



Vaksinen blir tilrådd til personar som

- er 65 år eller eldre
- har sjukdom som gjev immunsvikt
- brukar medisinar som svekkjer immunforsvaret
- har sjukdomar eller andre tilstandar som gjev auka risiko

Kvifor skal eg vaksinere meg? Dei fleste som blir smitta med pneumokokkar blir ikkje sjuke, men nokon blir alvorleg sjuke. Dei fleste som får alvorleg pneumokokksjukdom, blir ofte lagde inn på sjukehus, og dødelegheita er høg.



Les meir på fhi.no/vaksemvaksinasjon

Det beste du kan gjere for å verne deg sjølv, er å ta pneumokokkvaksine.

Pneumokokkbakterien finst i nas og svelg, særleg hos friske barn. Smitte skjer via hosting, nysing og liknande.

Flere ulike pneumokokkvaksinar er tilgjengelege. Alle vaksinane gjev godt vern. Fastlegen din veit kva som er best for deg.

Kor ofte bør eg vaksinere meg? Vaksinane har god effekt. Behovet for påfyll vil variere ut frå kva vaksine du har teke. Det har vore vanleg å fornye vaksinen kvart sjette år, men no blir det gjeve tilbod om ein vaksine som ikkje treng påfyll. Snakk med legen din viss du er usikker på om du har behov for vaksine.

Kan eg ta pneumokokkvaksine samtidig med andre vaksinar? Pneumokokk-, korona- og influensavaksine kan ein ta samtidig, men pneumokokkvaksine skal ikkje takast kvart år.

Har vaksinen biverknader? Allergiske reaksjonar eller andre alvorlege biverknader er sjeldne.

Kvar kan eg ta pneumokokkvaksine? Sjekk med legen din eller på nettsidene til kommunen om kvar du kan få vaksine.

Spesielle risikogrupper kan få vaksinen gratis på blå resept, men dei fleste må betale. Det året du fyller 65 år får du vaksine til rabattert pris gjennom vaksenvaksinasjonsprogrammet. Er du utsett for sjukdom gjennom jobben, skal arbeidsgjevar dekkje utgiftene.



Vaksiner til voksne | Bokmål - utgitt 2025

Vaksine mot koronavirus

Koronaviruset gir sykdom i luftveiene. Mange får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. Koronavaksine forebygger alvorlig sykdom og død.



Koronavaksine anbefales dersom du

- er 75 år eller eldre
- bor på sykehjem
- er mellom 18-74 år og tilhører en risikogrupper
- er barn med alvorlig sykdom

Beholdningen du har oppnådd etter tidligere vaksinasjoner eller gjennomgått sykdom, vil ikke over 12-14 måneder derfor at de som er mest utsatt for alvorlig covid-19, har en god årsad for vaksinasjonen.

Kan vaksine gi samtidig med andre vaksiner? Vaksinen gir god beskyttelse mot alvorlig covid-19, men gir ikke samtidig med andre vaksiner.

Har vaksinen biverknader? De fleste som får vaksinen får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. Koronavaksine forebygger alvorlig sykdom og død.

Har vaksinen biverknader? De fleste som får vaksinen får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. Koronavaksine forebygger alvorlig sykdom og død.

Har vaksinen biverknader? De fleste som får vaksinen får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. Koronavaksine forebygger alvorlig sykdom og død.



Les meir på fhi.no/vaksemvaksinasjon



Influensavaksine til barn | Bokmål - utgitt 2025

Noen barn blir alvorlig syke av influensa

I Norge har 80 000 barn økt risiko for å bli alvorlig syke på grunn av influensa.



Barn med følgende sykdommer eller tilstander bør få influensavaksine årlig:

- Kronisk lungesykdom (inkludert astma)
- Hjelpekraft
- Kronisk nedsatt funksjon eller tilstand som påvirker hjernefunksjonen
- Nedsatt immunitet
- Behandling med kortikosteroider (inkludert injeksjoner)
- Levert eller nyreproblemer
- Diabetes
- Svært alvorlig fedme
- Annet alvorlig eller kronisk sykdom der influensa gir økt risiko for alvorlig sykdom, eller indikasjon på alvorlig sykdom (f.eks. barn med medfødt immunsvikt og genetiske sykdommer)

Premature barn. Risikoen er høyere for barn født før uke 32 i svangerskapet. Vaksine anbefales årlig for barn født før uke 32.

Hva er influensa og hvorfor kan det være alvorlig? Influensa er en virusinfeksjon som gir symptomer som feber, hoste og løperose. Influensa er ikke det samme som forkjølelse.

Influensasykdommer kommer ofte i bølger, med høy feber, muskelsmerter, hoste og løperose. Noen barn kan oppleve komplikasjoner som øyeblikkelig sykdom, og til og med dødsfall.

Influensavaksiner gir beskyttelse i Norge hvert år i perioden oktober til mai, infeksjon er vanlig året rundt.

Ekstra farlig for noen: Om lag 100 barn blir hvert år alvorlig syke av influensa, og de må bli behandlet på sykehus.



Les meir på fhi.no/vaksemvaksinasjon



Vaksiner til voksne | Bokmål - utgitt 2025

Influensavaksine til helsepersonell

Influensa forårsaker alvorlig sykdom og dødsfall i sårbare grupper. Ta vaksinen for å beskytte deg selv, pasientene og dine nærmeste.



Influensabrudd i helsepersonell

Har vaksine beskyttet stort helsepersonell kan redusere influensasykdom og alvorlig sykdom i helsepersonell. Dette er spesielt viktig for pasienter som ikke ser seg selv, og for pasienter som har redusert effektivitet av vaksiner på grunn av nedsatt immunitet.

Beholdningen du har oppnådd etter tidligere vaksinasjoner eller gjennomgått sykdom, vil ikke over 12-14 måneder derfor at de som er mest utsatt for alvorlig covid-19, har en god årsad for vaksinasjonen.

Kan vaksine gi samtidig med andre vaksiner? Vaksinen gir god beskyttelse mot alvorlig covid-19, men gir ikke samtidig med andre vaksiner.

Har vaksinen biverknader? De fleste som får vaksinen får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. Koronavaksine forebygger alvorlig sykdom og død.

Har vaksinen biverknader? De fleste som får vaksinen får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. Koronavaksine forebygger alvorlig sykdom og død.

Har vaksinen biverknader? De fleste som får vaksinen får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. Koronavaksine forebygger alvorlig sykdom og død.



Les meir på fhi.no/vaksemvaksinasjon



Vaksiner til voksne | Bokmål - utgitt 2025

Influensavaksine til gravide

Influensa er like vanlig blant gravide som blant andre, men gravide har høyere risiko for å bli alvorlig syke, og sannsynligheten for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet. Siden alvorlig sykdom også utgjør en fare for fosteret, beskytter vaksinen både mor og barn.



Arbeidsgiver til gravide

Gravide 1 og 2 i svangerskapet anbefales influensavaksine for vaksinasjonen.

Gravide 3 i svangerskapet anbefales influensavaksine dersom det er indikasjon på alvorlig sykdom, eller hvis det er økt risiko for alvorlig sykdom eller død på grunn av influensa.

Arbeidsgiver gir for best- og vaksinasjonen 100% av kostnaden.

Beholdningen du har oppnådd etter tidligere vaksinasjoner eller gjennomgått sykdom, vil ikke over 12-14 måneder derfor at de som er mest utsatt for alvorlig covid-19, har en god årsad for vaksinasjonen.

Kan vaksine gi samtidig med andre vaksiner? Vaksinen gir god beskyttelse mot alvorlig covid-19, men gir ikke samtidig med andre vaksiner.

Har vaksinen biverknader? De fleste som får vaksinen får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. Koronavaksine forebygger alvorlig sykdom og død.

Har vaksinen biverknader? De fleste som får vaksinen får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. Koronavaksine forebygger alvorlig sykdom og død.



Les meir på fhi.no/vaksemvaksinasjon



Kommunikasjonskampanje

- To kampanjeperioder
 - Lansering, uke 42- 43
 - Påminnelse, uke 45 – 46
- Kanaler
 - Lokal- og regionsaviser (print og digital)
 - Fag- og ukepresse
 - Boards
 - Skjermer på legekontor
 - Sosiale medier



E-læringsportal

Gratis e-læringskurs om vaksinasjon

Artikkel | Sist endret 02.06.2025



Folkehelseinstituttet tilbyr e-læringskurs for vaksinatører og andre som organiserer, eller på annen måte befattes med, vaksiner til voksne og risikogrupper i alle aldre. Kurset er gratis og krever ikke pålogging.



[Lenke: Gratis e-læringskurs om vaksinasjon - FHI](#)

Tips

- Eventuelt inngå avtaler med kommunen og ha dialog med EPJ-leverandør om takster
- Legeforeningen og KS er blitt enige om å anbefale at medlemmene bruker veiledende satser ved vaksineringsprogram
- Oppdatert informasjon på nettsider
- Spre gjerne oppdatert informasjon om voksevakasinasjon til pasientene.
- Nyttige kilder:
 - Kommunens nettsider
 - FHI's nettsider (<https://www.fhi.no/va/voksevakasinasjon/>)
 - [Informasjonsbrev om voksevakasinasjonsprogrammet](#)
- Hvordan nå ut til særskilte grupper? ([Verktøykasse](#))
- NFA har bedt oss tipse om de vil oppdatere [vaksinasjonsguiden for leger](#)



Spørsmål fra chatten

