

TILLEGGSTILTAK VED ØKT SMITTERISIKO

- Vurder kortvarig isolering inntil redusert risiko
- Smittefrakk ved kontakt med pasient og pasientens omgivelser; bruk munnbind i tillegg ved MRSA, *C. auris* eller luftveissymptom
- Utstyr – rombundet hvis mulig, rengjøring OG desinfeksjon før bruk til andre
- Sluttrenhold og -desinfeksjon av rommet ved oppheving av isolering

TILLEGGSTILTAK VED KJENT BÆRERSKAP

- Eget pasientrom med toalett, nøytralt dørskilt viser smitteverntiltak
- Pasienten bør ha rene klær, bandasjer og inkontinensmateriell, fokus på håndhygiene
- Undersøkelse og behandling fortrinnsvis på eget rom
- Smittefrakk ved kontakt med pasient og pasientens omgivelser; bruk munnbind i tillegg ved MRSA, *C. auris* eller luftveissymptom
- Utstyr – rengjøres OG desinfiseres mellom hver pasient
- Daglig rengjøring og desinfeksjon av hyppige kontaktpunkter på rommet
- Sluttrenhold og -desinfeksjon ved utskrivelse

GRUNNLEGGENDE TILTAK – utdrag fra BASALE SMITTEVERNROUTINER

- Håndhygiene – før pasientkontakt, før rene oppgaver, etter kontakt med kroppsvæsker og etter pasientkontakt
- Personlig verneutstyr
 - Hansker – ved kontakt med kroppsvæsker, slimhinner eller forurensede flater, farlige kjemikalier eller ved sår på hender
 - Beskyttelsesfrakk/forkle – ved stell og ved fare for sprut og søl på tøy
 - Munnbind – ved luftveissymptom hos en selv eller pasient, eller fare for sprut av kroppsvæsker
 - Briller/visir – ved fare for sprut av kroppsvæsker
- Utstyr – rengjøres mellom hver pasient
- Renhold – daglig



Se Håndbok for basale smittevernrutiner på fhi.no for full oversikt