


คู่มือฉบับย่อสำหรับวัคซีนโควิด-19

ข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 (โควิด-19) จากสถาบันสาธารณสุขแห่งนอร์เวย์




เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19

วัคซีนนี้จะเสนอให้กับทุกคนที่ได้รับการแนะนำให้ใช้

วัคซีนนี้ฟรี

วัคซีนนี้ป้องกันโควิด -19




คุณจะได้รับการฉีดวัคซีนอย่างไร

ฉีดวัคซีนจะต้องฉีดเข้ากล้ามเนื้อต้นแขน

วัคซีนบางอย่างจะต้องฉีดซ้ำสองครั้งโดยห่างกันไม่กี่สัปดาห์

อย่าลืมแจ้งว่าคุณกำลังตั้งครรภ์หรือไม่ แพ้อะไร ได้ใช้ยาอะไรอยู่ กำลังป่วยอยู่ หรือเคยติดเชื้อโควิด -19



วัคซีนจะทำงานได้ดีแค่ไหน

คนส่วนใหญ่ได้รับการป้องกันโควิด -19 ภายใน 1-2 สัปดาห์หลังจากได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน

ปฏิบัติตามคำแนะนำในการควบคุมการติดเชื้อ แม้ว่าท่านได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็ตาม



วัคซีนจะทำงานอย่างไร

วัคซีนจะทำให้ร่างกายรู้จักและป้องกันตัวเองจากไวรัสโคโรนา

วัคซีนจะถูกส่งออกจากร่างกายอย่างรวดเร็ว


อย่างไรก็ตาม ร่างกายจำวิธีป้องกันตัวเองจากไวรัส

ผลข้างเคียง

วัคซีนได้รับการทดสอบในการศึกษาขนาดใหญ่กับผู้คนหลายพันคน ผลข้างเคียงที่พบบ่อยดังนี้

- ปวดในบริเวณที่ฉีด
- รู้สึกเหนื่อย
- ปวดหัว
- ปวดกาย
- อาการไข้หนาวสั่น

ผลข้างเคียงเหล่านี้จะทำให้ผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไม่สบายตัว และจะหายดีในสองสามวัน



ผลข้างเคียงที่ผิดปกติ

ติดต่อแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอื่น ๆ หากคุณมีอาการที่ไม่คาดคิด รุนแรงหรือเป็นเวลานานหลังจากได้รับวัคซีน

