

تعلّم عن لقاح كورونا بطريقة مبسّطة


معلومات موجزة من المعهد النرويجي للصحة العامة (Folkehelseinstituttet) حول اللقاح ضد مرض كورونا كوفيد-19.

من ينبغي عليه أن يأخذ لقاح كورونا؟

أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر.

البالغين المصابين بأمراض معينة

اللقاح مجاني




كيف يتم التلقيح؟

يتم إعطاء اللقاح عن طريق حقنة في أعلى الذراع.

سيعطى اللقاح مرتين تفصل بينهما بضعة أسابيع.

تذكر الإبلاغ عما إذا كنت تعاني من الحساسية أو تستخدم أدوية أو تعاني من المرض.




ما مدى فعالية اللقاح؟

يقي اللقاح من مرض كورونا كوفيد-19.

يحصل معظم الناس على الحماية بعد أسبوع إلى أسبوعين من حصولهم على الجرعة الثانية من اللقاح.

يجب على الذين تم تلقيحهم اتباع القواعد المعتادة لمكافحة العدوى.



كيف يعمل اللقاح؟

يَعْلَمُ اللقاح الجسم أن يتعرف على فيروس كورونا وأن يحمي نفسه منه.

تختفي محتويات اللقاح من الجسم بسرعة.

لكن الجسم يتذكر كيف يمكنه الدفاع عن نفسه ضد الفيروس.




الآثار الجانبية

تم اختبار اللقاح في دراسات كبيرة أجريت على عدة آلاف من الناس. الآثار الجانبية الشائعة هي:


- ألم في موقع الحقن
- إعياء
- صداع الرأس
- آلام في الجسم
- قشعريرة وحمى

هذه الآثار الجانبية مزعجة، ولكنها تزول بعد بضعة أيام.



آثار جانبية غير شائعة

اتصل بطبيبك أو اختصاصي رعاية صحية آخر إذا ظهرت لديك أعراض غير شائعة قوية أو أعراض مستديمة بعد التلقيح.



إذا كنت تريد الحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية حول لقاح كورونا، فراجع موقع المعهد الوطني للصحة العامة:

<https://www.fhi.no/kvp>