



Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.4-5 (Moderna)




KLARGJØRING

- Tidspunkt for opptining må følge hvert hetteglass (ikke noter på glasset).
- Hetteglasset skal **virvles** forsiktig etter opptining, **ikke rist**.
- Vaksinen er en hvit til off-white væske som kan inneholde hvite eller gjennomsviktige produktrelaterte partikler. Inspiser vaksinen før bruk, og kassér den hvis misfarging eller andre typer partikler forekommer.
- Vaksinen skal **ikke fortynnes**.

OPPTREKK

0,5 ml dose



- Dosestørrelse er **0,5 ml**.
- Hvert hetteglass gir 5 doser á 0,5 ml. For å sikre tilstrekkelig antall doser er det en overfylling i hetteglassene. Opptrekk > 5 doser á 0,5 ml er off-label bruk og må godkjennes av ansvarlig lege.
- Hetteglasset skal **virvles forsiktig før hvert opptrekk**.
- Desinfiser membranen på hetteglasset og la den tørke.
- Bruk samme kanyle til opptrekk og injeksjon, det vil si ny steril kanyle og sprøyte for hver dose. Kanylestørrelse (21G eller 23G) for intramuskulær injeksjon vurderes ut fra pasientens størrelse og kroppsvekt.
- Koble kanyle på 1 ml sprøyte og trekk opp tilstrekkelig vaksine slik at dosen som gis blir 0,50 ml inkludert dødvolum. Opptrekkskanyle med filter skal **ikke** brukes.
- **Registrer tidspunkt for første punksjon** av membranen på hetteglasset.
- Vaksinerester fra ulike hetteglass skal **ikke** blandes.
- Klargjorte sprøyter bør ikke transporteres.

HOLDBARHET

Ikke-punkttert hetteglass:

- 2-8°C: Inntil 30 døgn.
- Romtemp (maks 25°C): Inntil 12 timer.

Etter første punksjon av membranen på hetteglasset:

2-25°C: Inntil 12 timer forutsatt at arbeidsmetoden hindrer tilføring av mikrober.

Etter opptrekk i sprøyte:

Skal brukes snarest mulig, fortrinnsvis innen 60 minutter.



SYSVAK-kode
SBA45

Dødvolum = volum inni kanyle og tomrom mellom kanyle og sprøytetupp

Se mer i
koronavaksinasjons-
veilederen på FHI
sine nettsider!

