

درباره سیفلیس

سیفلیس چی است؟

سیفلیس بر اثر عفونت میکروبی ایجاد میشود. این مریضی مراحل مختلفی دارد و در صورت عدم تداوی میتواند منجر به یک دوره مریضی شدید شود.

سیفلیس چی قسم منتقل میشود؟

سیفلیس در جریان رابطه جنسی از طریق غشاهای مخاطی اندام تناسلی، دهان یا مقعد منتقل میشود. انتقال از مادر به طفل میتواند در دوران حاملگی اتفاق بیفتد و ممکن است منجر به تولد طفل مرده یا عفونت شدید در طفل (سیفلیس مادرزادی) شود. خطر انتقال در مراحل اولیه این مریضی بسیار بلند است. اگر مادر در مدت چهار ماه اول حاملگی تحت تداوی قرار بگیرد، طفل به ندرت مصاب میشود.

چرا انجام تست سیفلیس مهم است؟

در صورتیکه شما از یک کشوری می آید که سیفلیس در آن شیوع دارد، مهم است که تست سیفلیس بدهید. بخصوص این مسئله برای خانمهای حامله مهم است، بنابراین آنها به شکل منظم بررسی میشوند. همچنین مهم است بدانید که آیا شما مصاب هستید یا خیر تا بتوانید از مصاب نمودن اشخاص دیگر جلوگیری کنید. اگر شما مطمئن نیستید که در معرض عفونت قرار گرفته اید یا خیر، باز هم میتوانید برای انجام یک تست درخواست بدهید. انجام تست اختیاری و رایگان است.

اعراض و علائم سیفلیس چی است؟

سیفلیس میتواند بدون اعراض و علائم، پیشرفت کند و الی 3 ماه طول بکشد تا این مریضی ذریعه تست خون تشخیص داده شود.

در اوایل دوره این مریضی، بعضی از اشخاص متوجه یک زخم بدون درد در ناحیه ای که میکروب وارد بدن شده است میشوند، بعنوان مثال در ناحیه تناسلی، مقعد، انگشتان دست یا دهان. این زخم در مدت چند هفته خود بخود خوب میشود. در صورت عدم تداوی، تقریباً نیمی از اشخاصیکه مصاب میشوند، نهایتاً به اعراض و علائم دیگری (در طول چند هفته، ماه یا الی 2 سال) مصاب میشوند. شایع ترین این اعراض و علائم عبارتند از ماندگی، اندفاعات جلدی، پدیدگی غدد لنفاوی و ریزش موی. اندفاعات جلدی معمولاً در ساحات بالای بدن، در کف دستها و در کف پای ها دیده میشود. همچنین سیفلیس میتواند سیستم عصبی مرکزی را ملوث نماید و بینایی و شنوایی را متاثر بسازد. اگر سیفلیس در جریان سالها تداوی نشود، میتواند باعث امراض قلبی و عایی و مغزی شود.

چطور میتوان از مصاب شدن به سیفلیس جلوگیری کرد؟

مهمترین قدم برای محافظت از خود در مقابل عفونت سیفلیس، استفاده از کاندوم در زمان مقاربت جنسی واجینال و مقعدی و همچنین در زمان رابطه جنسی دهانی است.

در صورتیکه نتیجه تست سیفلیس مثبت تشخیص شود، چه نوع تعقیب بعد تداوی را باید انجام دهید؟

اگر تست شما مثبت تشخیص شد، برای ارزیابی به یک متخصص ارجاع خواهید شد و تداوی انتی بیوتیکی در نظر گرفته میشود. تداوی موثر است و شما به شکل مکمل، صحتیاب و عاری از عفونت خواهید شد. با اینحال، ممکن است مجدداً مصاب شوید.

سکرینگ، تداوی و تعقیب رایگان است. تعقیب بعد از تداوی شامل انجام تست خون در ماههای 3، 6 و 12، بعد از ختم شدن تداوی است.

نتایج تست تأثیری بالای اقامت در ناروی نخواهد داشت.