

## О сифилисе

### Что такое сифилис?

Сифилис – это бактериальное инфекционное заболевание, возбудителем которого является бледная трепонема или бледная спирохета. Это заболевание имеет несколько стадий развития, и без лечения эта болезнь может привести к тяжелым поражениям всего организма человека.

### Как передается сифилис?

Сифилис – это венерическое заболевание и передается половым путем. Возбудитель сифилиса попадает в организм человека через слизистые оболочки половых органов, рта или ануса (заднепроходного отверстия). Заражение плода от матери происходит внутриутробно, во время беременности, и может привести к выкидышу или рождению мертвого ребенка, либо к серьезным врожденным патологиям у ребенка. Риск заражения особенно высок на ранних стадиях болезни. Если лечение больной сифилисом беременной женщины проводится в течение первых четырех месяцев беременности, то у будущего ребенка есть много шансов родиться живым и здоровым, без признаков сифилиса.

### Почему важно сделать анализ на сифилис?

Если вы приехали из страны, где сифилис очень распространен, очень важно, чтобы вы сдали анализ на сифилис. Особенно важно это сделать беременным женщинам, и поэтому все беременные регулярно проходят скрининг. Если вы заражены, то об этом важно знать также и для того, чтобы не допустить заражения тех, с кем вы общаетесь. Даже если вы не уверены в том, что были подвергнуты заражению, вы можете попросить сделать анализ. Сдача анализа – дело добровольное, а обследование проводится бесплатно.

### Каковы симптомы сифилиса?

Сифилис – это заболевание, которое может протекать бессимптомно, и иногда с момента заражения может пройти до 3 месяцев, прежде чем анализ крови покажет наличие болезни.

На ранней стадии заболевания некоторые могут обратить внимание на безболезненную ранку (т.н. шанкр) в месте проникновения бактерий в организм человека, например, на половых органах, анусе, пальцах или во рту. Ранка заживает самостоятельно в течение нескольких недель после возникновения. Если не начать лечение, то примерно у половины из инфицированных постепенно (в течение от нескольких недель или месяцев, до двух лет) обнаружатся другие симптомы. Наиболее обычными симптомами являются общая слабость, сыпь, воспаленные лимфатические узлы и выпадение волос. Сыпь образуется обычно в области груди, шеи и верхней части спины (ожерелье Венеры), на ладонях рук и подошвах ног. Возбудитель сифилиса может также поражать центральную нервную систему, приводя к нарушению зрения и слуха. В отсутствии лечения сифилис, через много лет, приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и мозга.

### Как избежать заражения сифилисом?

Важнейшим способом защиты от заражения сифилисом является использование презерватива при вагинальном и анальном сексе, а также при оральном сексе.

### Какое лечение и последующее наблюдение вам предложат, если результат анализа на сифилис будет положительным?

При положительном результате анализа вы получите направление к специалисту для диагностики и, возможно, лечения антибиотиками. Лечение антибиотиками весьма эффективно, и вы становитесь здоровым и незаразным. Однако, вы не защищены от риска вновь заразиться в будущем.

Обследование, лечение и последующее наблюдение предоставляются бесплатно. Последующее наблюдение включает в себя анализы крови через 3, 6 и 12 месяцев после окончания курса лечения.

Результаты анализов не окажут негативного влияния при рассмотрении вашего заявления о разрешении на временное пребывании в Норвегии.