Vaksinering av barn og ungdom i alderen 6 måneder til og med 15 år

COVID-19 (koronasykdom) gir i hovedsak luftveisinfeksjon, men kan også gi symptomer fra andre organer. De aller fleste barn og unge vil tåle COVID-19 godt, men som for voksne så har de med enkelte sykdommer høyere risiko for å bli alvorlig syke. Derfor anbefales personer opp til 18 år med alvorlige tilstander eller grunnsykdommer som kan gi økt risiko for alvorlig COVID-19, årlig vaksinasjon.

Tidligere uvaksinerte barn med alvorlig grunnsykdom i alderen 6 måneder til 4 år, som tidligere ikke har gjennomgått COVID-19, skal normalt ha 2 eller 3 doser avhengig av hvilken vaksine som tilbys. Vaksinasjonsstedet gir informasjon om antall doser og intervaller mellom dosene.

Barn i alderen 6 måneder til 11 år bør vurderes individuelt av lege før vaksinasjon.

Anbefalingen gjelder barn som har:

- gjennomført organtransplantasjon
- immunsvikt
- hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
- annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft
- nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
- kronisk alvorlig leversykdom
- kronisk alvorlig nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
- alvorlig hjertesykdom
- alvorlig lungesykdom
- annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der covid-19 utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av barnelege, for eksempel personer med medfødte kromosomavvik (for eksempel Downs syndrom) og genetiske syndromer.

COVID-19-vaksine til barn

Vaksinasjon er det beste tiltaket for å forebygge alvorlig COVID-19. Vaksinen inneholder ikke levende virus og kan ikke gi koronainfeksjon.

De aller fleste bivirkningene som oppstår 1-2 dager etter vaksinasjon, er milde/moderate og går over etter noen dager. Vanlige bivirkninger er smerter og hevelse på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Allergiske reaksjoner kan forekomme.

Tilfeller med kraftige menstruasjonsblødning er rapportert, men de fleste tilfellene er lite alvorlige og forbigående.

Betennelse i hjertemuskelen eller hjerteposen (myokarditt/perikarditt) kan i svært sjeldne tilfeller oppstå etter vaksinasjon. Tilstanden gir brystsmerter, tungpust, hjertebank og feber. Ved slike symptomer, må lege kontaktes. COVID-19 kan gi mer alvorlig hjertepåvirkning hos enkelte, enn det som kan oppstå etter vaksinen. Derfor bør denne bivirkningen ikke hindre barn og ungdom i å få tilbud om vaksine.

Før vaksinasjon

Vaksinering er frivillig. De som ikke har fylt 16 år, må ha foresattes samtykke til vaksinering. Ved felles foreldreansvar, må begge foresatte samtykke. Også barn under 16 år har rett til å få informasjon og skal høres ut fra dets alder og modenhet.

Gi beskjed dersom barnet tidligere har hatt alvorlig allergisk reaksjon, eller har fått annen vaksine for mindre enn en uke siden.

Klipp her

Barnets navn:	Fødselsdato:

Jeg/vi ønsker at barnet mitt/vårt skal vaksineres mot COVID-19.

Kryss av for hvilken dose det nå samtykkes til:

Årlig dose ☐

For tidligere uvaksinerte barn med alvorlig grunnsykdom i alderen 6 måneder til 4 år, som tidligere ikke har gjennomgått COVID-19 infeksjon, eller eldre barn med alvorlig grunnsykdom:

Dose 1 ☐ Dose 2 ☐ Dose 3 ☐

Foresatte med foreldreansvar:

Foresatt 1:

Fullt navn (skriv tydelig): _____

Underskrift: _____

Telefonnummer: _____

Foresatt 2:

Fullt navn (skriv tydelig): _____

Underskrift: _____

Telefonnummer: _____