


صحت کے کارکنوں کے لیے انفلوئنزا ویکسین



بالغ افراد کو انفلوئنزا ویکسین سے فلو نہیں پو سکتا کیونکہ اس میں انفلوئنزا وائرس کے صرف ٹکڑے ہوتے ہیں۔

انفلوئنزا ویکسین کورونا وائرس یا ان دوسرے وائرسون اور بیکٹیریا سے نہیں بچائی جو فلو جیسی علامات کا سبب بن سکتے ہیں۔

موسی انفلوئنزا کی ویکسین سے شدید ضمیمنی اثرات پہونا شاذونا دیے۔ عام ضمیمنی اثرات انجیکشن لگنے کی جگہ پر سرخی، چھوٹ سے درد اور سوجن ہیں۔ کچھ لوگوں کو بخار، پٹھوں میں درد اور عمومی خرابی طبیعت کا احساس پو سکتا ہے۔ شدید الرجک رد عمل بہت کم ہوتے ہیں۔

ویکسین اکتوبر/نومبر میں، فلو کا موسم شروع ہونے سے پہلے لگوانی چاہیے۔ تحفظ مہیا ہونے میں 1 سے 2 ہفتے لگتے ہیں۔

عام طور پر علامات ظاہر ہونے سے ایک دن پہلے انفیکشن بھیلنا شروع پو سکتا ہے اور وہ بیمار ہونے کے 3 سے 5 دن بعد تک انفیکشن پھیلا سکتے ہیں۔

کیا آپ زیادہ خطرہ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں؟
مریضوں سے واسطہ رکھنے والے تمام عملہ صحت اور نرنسنگ سٹاف کو ویکسین لگوانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ یہ خاص طور پر ان کارکنوں کے لیے اہم ہے جن کا واسطہ زیادہ خطرہ رکھنے والے مریضوں سے ہوتا ہے، مثال کے طور پر بوڑھوں کی دیکھ بھال، نوزادیہ بچوں کے شعیے، کینسر کے علاج، انفیکشنز کے علاج یا انتہائی نگہداشت کے یونٹوں میں کام کرنے والے۔

جن کارکنوں کو انفیکشن سے واسطہ پڑتا ہے، ان کا آجر ان سب کو ویکسینیشن کی پیشکش کرے گا اور اس کے اخراجات اٹھائے گا۔ اپنے کام کی جگہ پر ویکسینیشن کے متعلق معلومات کے لیے اپنے آجر سے رابطہ کریں۔

فلو ویکسین کے متعلق اہم معلومات انفلوئنزا وائرس مسلسل بدلتا رہتا ہے اور ویکسین کو ہر سال وائرس کی ان اقسام کے مطابق بدلا جاتا ہے جو پھیلی ہوئی ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ویکسین کا اثر بھی کم ہو جاتا ہے لہذا ہر سال ویکسین لگوانا ضروری ہے۔

صحت کے اداروں میں انفلوئنزا کی وبا صحت کے کارکنوں کی بڑی تعداد کی ویکسینیشن کے ذریع انفلوئنزا کی بیماری اور نگہداشت صحت کے اداروں میں انفلوئنزا کے کیسیوں کو کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ خاص طور پر ان مریضوں کے لیے اہم ہے جو خود ویکسین نہیں لگوا سکتے، اور ان مریضوں کے لیے بھی جن کے کمزور مدافعتی نظام کی وجہ سے ویکسین کا اثر کم ہوتا ہے۔

ہنگامی صورتحال کے لیے تیاری صحت کے کارکنوں کی بڑی تعداد کا انفلوئنزا ویکسین لگوانا متعدد بیماریوں کے بڑے پیمانے پر پھیلاؤ کے دوران ہنگامی صورتحال کے تسلی بخش تیاری کے لیے بھی اہم ہے۔

انفیکشن کا زیادہ خطرہ عملہ صحت کو انفلوئنزا انفیکشن لگنے کا امکان ان بالغ افراد کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ ہوتا ہے جو صحت کے شعبے میں کام نہیں کرتے۔ اگر آپ کو انفیکشن لگ جائے تو آپ سے یہ بیماری دوسروں تک پھیل سکتی ہے چاہے آپ میں واضح علامات نہ ہوں۔ وائرس قطروں، بہوا اور چھوٹے ذریع ایک انسان سے دوسرے تک پہنچتا ہے۔ بالغ افراد سے



یہاں مزید تفصیل پڑھیں
fhi.no/voksenvaksinasjon