



Meslinger

Global situasjon - forekomst - dekning

Vaksine- og smitteverndagene 2026

Tone Bruun

11. februar 2026

2025

Åftenposten

NyheterOsloMeningerA-magasinetVinkE-avis

Tone

Kommentar | Meslinger

Ikke la deg lure av ordet «barnesykdom»

Ingeborg Senneset

Journalist

Lytt til artikkelen • 5 min



Vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder er kjent under navnet MMR-vaksine. I Norge har barna tilbud om vaks klasserinn. Illustrasjonsbildet viser en gutt med røde hunder (rubella). Foto: Aleksandr Finch, Shutterstock/NTB

Meslingsmitten er på høyeste nivå i Europa på 25 år. I er alvorlig - viruset er en hyperaktiv jævel.

FHI -

Meny

Dagsavisen

Få tilgang

Logg in

Verden

Over tusen tilfeller av meslinger i USA

Antall tilfeller av meslinger i årets utbrudd i USA har passert 1.000, ifølge det amerikanske folkehelseinstituttet CDCP.



i Seminole i Texas.

NRK

NyheterSportKulturHumorDistriktMer

Ytring

KRONIKK

God meslingfri ferie

Skal du på ferie med små barn? Husk pass, solkrem og MMR-vaksinen.



Astrid Mjølhusund
Helsemagasinet

Publisert 14. apr. 2025 kl. 05:13

VG LiveVGTVArkivTV-guideTips ossVG Tiltale

Meslinger

Dagbladet

Prematur baby døde av meslinger i Canada

Moren ble smittet under svangerskapet.

Kritisk spredning

I flere år trodde vi den farlige sykdommen meslinger var utryddet. Nå sprer den seg i stort tempo i flere land, blant annet i USA.



forskning.no

DebattUngPodcastJobb

Meslinger øker i Europa: – Ekstremt smittomt, advarer FHI

Lav vaksinasjonsdekning fører til at det har vært en økning i meslingtilfeller i Europa de siste årene. FHI sier smitte er sjelden i Norge, men advarer likevel.



Folkehelseinstituttet ber folk ta vaksine mot meslinger. (Illustrasjonsfoto: Natalya Maisheva/Shutterstock/NTB)


NTB.

Om meslinger

- Typiske symptomer: feber, hoste, snue, konjunktivitt, utslett, Koplikske flekker i munnen, slapphet
- Ingen spesifikk behandling
- Svært smittsom, luft- og kontaktsmitte, kan holde seg aktivt og smitteførende i luft og på overflater i opptil 2 timer
- I en ikke-immun befolkning vil én syk smitte 12–18 andre
- 95 % av befolkningen må være immune for å stoppe smitten



Illustrasjon: Foto: CDC



Illustrasjon: Foto: CDC

Er meslinger alvorlig?

- Før vaksinen – den mest alvorlige av barnesykdommene i Norge
(Uten vaksinen ville alle fått meslinger – 50-60 000 per år i Norge)
- Meslinger påvirker immunforsvaret i opptil flere år – gir flere og mer alvorlige infeksjoner
- Komplikasjoner (vanligst hos spedbarn, voksne, gravide, immunsupprimerte, underernærte)
 - ca. 20 %: ørebetennelse, lungebetennelse, diare
 - ca. 1 av 1000: hjernebetennelse (etter 1-2 uker), flere med varig hjerneskade
 - 1 av 100 000 – 1 000 000: subakutt skleroserende encefalitt (etter noen år) – alltid dødelig
- Dødelighet i høyinntektsland: mellom 1 av 1000 og 1 av 10 000?
- Dødelighet i lavinntektsland: Oppimot 20 – 30 % ved alvorlig underernæring, spesielt økt risiko ved vitamin A-mangel
- Mer enn to millioner dødsfall årlig før vaksinasjonsdekning ble høy globalt på 1980-tallet

[Health Topics](#) ▾[Countries](#) ▾[Newsroom](#) ▾[Emergencies](#) ▾[Data](#) ▾[About WHO](#) ▾[Home](#) / [News](#) / Measles deaths down 88% since 2000, but cases surge[Credits](#)

Measles deaths down 88% since 2000, but cases surge

[العربية](#)[中文](#)[Français](#)[Русский](#)[Español](#)

Situasjonen globalt

- En av de vanligste dødsårsaker blant små barn i verden

2000-2024:


- Årlig antall meslingetilfeller redusert fra 38 mill → 11 mill (71 %)
- Årlig antall meslingedødsfall fra 780 000 → 95 000 (88 %)
- 58 mill dødsfall forbygget med vaksinasjon

2019-2024

- Antall tilfeller økt med 8 %
- Antall dødsfall redusert med 11 %
- Flere tilfeller i mellominntektsland med lavere dødelighet
- Særlig nedgang i Afrika

Vaksinasjonsdekning globalt

Figure 1 **Global and regional trends in coverage for the first (left) and second (right) dose of measles-containing vaccine, 2000–2024**
Figure 1 **Évolution des couvertures mondiale et régionale par la première (gauche) et seconde (droite) dose de vaccin à valence rougeole, 2000–2024**



MCV1 = first dose of measles-containing vaccine; MCV2 = second dose of measles-containing vaccine. – MCV1 = première dose de vaccin à valence rougeole; MCV2 = deuxième dose de vaccin à valence rougeole.

¹ A country may be verified for elimination if the RVC confirms that there is no endemic virus transmission for a continuous period of ≥36 months in the presence of a high-quality surveillance system.

² See No. 41, 2018, pp. 544–552.

²¹ On considère que l'élimination est vérifiée dans un pays si le comité national de vérification confirme l'absence de transmission endémique du virus rougeoleux pendant une période ininterrompue de ≥36 mois, en présence d'un système de surveillance de qualité.

²² Voir N° 41, 2018, pp. 544–552.


USA

Yearly measles cases

as of January 13, 2026


2000–Present*

1985–Present*



3 dødsfall i 2025

USA



Vaksinasjonsdekningen blant amerikanske barnehagebarn har gått ned fra **95,2 %** i skoleåret 2019–2020 til **92,5 %** i skoleåret 2024–2025, noe som etterlater omtrent 286 000 barnehagebarn i risiko i skoleåret 2024–2025.



Autism and Vaccines

[QUESTIONS AND CONCERNS](#) | [PAGE 2 OF 9](#) | [ALL PAGES](#)




For Everyone

NOV. 19, 2025

KEY POINTS

- The claim "vaccines do not cause autism" is not an evidence-based claim because studies have not ruled out the possibility that infant vaccines cause autism.
- Studies supporting a link have been ignored by health authorities.
- HHS has launched a comprehensive assessment of the causes of autism, including investigations on plausible biologic mechanisms and potential causal links.

Number of confirmed measles cases reported in Canada



Source: Health Canada

MMR

Denis Campbell *Health
policy editor*

Mon 26 Jan 2026 22:00 CET

 Share

UK loses WHO status as measles-free after rise in deaths and fall in jab uptake

UN health body says Britain is one of six countries in Europe and central Asia where disease has become re-established




 A child receives her second dose of the MMR vaccination. Experts described the WHO's decision as a wake-up call. Photograph: David Gee/Alamy

The UK has lost its status as a measles-free country after a rise in deaths from the disease and fall in the proportion of children having the **MMR** jab in recent years.


The World Health Organization said it **no longer classified Britain** as having eliminated measles because the disease had become re-established.

The UK is one of six countries in Europe and central Asia that the WHO says is no longer measles-free, the others being Spain, Austria, Armenia, Azerbaijan and Uzbekistan.

Number of measles cases by month and year, EU/EEA, 1 January 2013 to 30 November 2025




Rapporte meslingtilfeller per million innbygger per land ECDC (EU/EØS), 2025



8 dødsfall (CFR 0.1 %) rapportert til ECDC av Frankrike (4), Romania (3) og Nederland (1)

Measles cases—WHO European Region, September 2023–August 2024




Top 10 countries	
Country	Cases
Kazakhstan	38522
Azerbaijan	30379
Russian Federation	21977
Kyrgyzstan	18072
Romania	14386
United Kingdom	2593
Türkiye	2367
Uzbekistan	2167
Bosnia and Herzegovina	1660
Italy	897

49 (92%) countries reported measles cases in the rolling 12-months.

Vaksinasjonsdekning for meslingvaksine dose 1 – ECDC (EU/EØS), 2024


Vaccination coverage for first dose of a measles-containing vaccine, EU/EEA, 2024 (Source: WHO, WUENIC)



Administration boundaries: © EuroGeographics
The boundaries and names shown on this map do not imply official endorsement or acceptance by the European Union. ECDC. Map produced on 2 February 2026.

Vaksinasjonsdekning for meslingvaksine dose 2 – ECDC (EU/EØS), 2024

Vaccination coverage for second dose of a measles-containing vaccine, EU/EEA, 2024 (Source: WHO, WUENIC)



Administration boundaries: © EuroGeographics
The boundaries and names shown on this map do not imply official endorsement or acceptance by the European Union. ECDC. Map produced on 2 February 2025.

Eliminasjon av meslinger

Målet er at alle land skal eliminere meslinger innen 2030

- Fravær av sirkulerende smitte i et definert geografisk område i minimum 12 måneder under et velfungerende overvåkingssystem
- Regional eliminasjon erklæres etter 36 måneders fravær av endemiske meslingetilfeller i alle land i regionen

Meslinger eliminasjonsstatus Europa 2024

Land uten sirkulerende smitte

Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Frankrike
Georgia
Italia
Polen
Romania
Russland
Serbia
Slovakia
Spania
Storbritannia
Tyrkia
Tyskland
Ukraina
Østerrike

Land med sirkulerende smitte

Albania	Moldova
Andorra	Monaco
Belgia	Montenegro
Danmark	Nederland
Estland	Nord-Makedonia
Finland	Norge
Belarus	Portugal
Hellas	San Marino
Irland	Slovenia
Island	Sveits
Kroatia	Sverige
Kypros	Tsjekkia
Latvia	Ungarn
Litauen	
Luxemburg	
Malta	

Meslinger eliminasjonsstatus Europa 2024

Land med sirkulerende smitte

Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Frankrike
Georgia
Italia
Polen
Romania
Russland
Serbia
Slovakia
Spania
Storbritannia
Tyrkia
Tyskland
Ukraina
Østerrike

Land uten sirkulerende smitte

Albania	Moldova
Andorra	Monaco
Belgia	Montenegro
Danmark	Nederland
Estland	Nord-Makedonia
Finland	Norge
Belarus	Portugal
Hellas	San Marino
Irland	Slovenia
Island	Sveits
Kroatia	Sverige
Kypros	Tsjekkia
Latvia	Ungarn
Litauen	
Luxemburg	
Malta	

Meslinger eliminasjonsstatus globalt 2024

- Den amerikanske regionen erklært meslingefritt i 2016 – som første og eneste WHO-region – frem til 2019, da de mistet sin status. I 2024 fikk de tilbake statusen – hva nå? Møte i April..
- Den afrikanske regionen: ingen land har eliminert meslinger
- Den østlige middelhavsregionen: meslinger eliminert i 4 land (19%)
- Den europeiske regionen: meslinger eliminert i 33 land (62%)
- Sørøst-Asia-regionen: meslinger eliminert i 4 land (40%)
- Den vestlige stillehavsregionen: meslinger eliminert i 6 land (21%)

Oppsummering

- Meslinger er en alvorlig sykdom som fremdeles fører til mye sykdom og død
- 95 % av befolkningen må være vaksinert med to doser for å stoppe smitten
- 58 millioner dødsfall forhindret med vaksinasjon siden 2020
- Lav forekomst under pandemien, men fallende vaksinasjonsdekning har ført til at smitten har blusset opp
- Økende antall tilfeller i mellominntektsland og noen høyinntektsland, fortsatt høyest sykdomsbyrde i lavinntektsland, men i noen områder bedret situasjon på grunn av vaksinasjonskampanjer
- 84 % av verdens 2-åringer har mottatt første dose (86% i 2019) – 76 % av barna har fått to doser
- Flere land har mistet status som meslingefrie de siste årene
- Enda flere land er nå i fare for å miste sin eliminasjonsstatus. USAs kutt i støtten til global helse har alvorlige konsekvenser



Takk for meg!