

Osoby dorosłe wymagają podania dawki przypominającej szczepionki co dziesięć lat

Nie wszystkie szczepionki, które przyjmujemy jako dzieci, zapewniają nam ochronę na całe życie. Osobom dorosłym zaleca się, aby dawki przypominające szczepionek przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi oraz polio przyjmowały co dziesięć lat.

Zalecenie to dotyczy wszystkich osób dorosłych, również tych, które nie planują podróży.

Znaczenie dawki przypominającej

Norweski Instytut Zdrowia Publicznego zaleca, aby dawki przypominające szczepionek przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (kokluszowi) oraz polio przyjmować co około dziesięć lat, nie tylko ze względu na zapewnienie indywidualnej ochrony, ale również utrzymanie wysokiej odporności całej populacji. Gdy większość populacji jest chroniona przed daną chorobą, osiągnąca jest odporność stadna zapewniająca ochronę również jednostkom niezaszczepionym. Niska wyszczepialność sprawia, że choroby, które obecnie nie występują w Norwegii (np. polio i błonica), mogą powrócić.

Nie masz pewności, czy potrzebujesz dawki przypominającej?

Zaloguj się do rejestru szczepień na stronie helsenorge.no (dostępnej w j. norweskim), aby sprawdzić wykaz szczepień własnych i swoich dzieci w wieku poniżej 16 lat. Placówka zdrowia publicznego, lekarz ogólny lub placówka zajmująca się szczepieniami przekaże Norweskiemu Rejestrowi Szczepień SYSVAK informacje o szczepionkach podawanych w Norwegii w ramach Programu Szczepień Ochronnych Dzieci. Do zarejestrowania szczepionek podawanych poza programem wymagana jest zgoda.

Skontaktuj się ze swoim lekarzem ogólnym lub kliniką wykonującą szczepienia podróżnych i umów się na wizytę.