

Взрослым требуется повторная вакцинация раз в десять лет

Не все вакцины, которые мы получаем в детстве, обеспечивают защиту на всю жизнь. Взрослым следует проходить вакцинацию от дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита каждые десять лет.

Эта рекомендация относится ко всем взрослым, а не только к тем, кто планирует отправиться в дальнюю поездку.

Важность повторной вакцинации

Норвежский институт здравоохранения рекомендует получать повторную дозу вакцины против дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита приблизительно раз в десять лет не только для индивидуальной защиты, но и для поддержания широкой иммунной прослойки населения. Когда большинство населения защищено от какой-либо болезни, достигается популяционный иммунитет, защищающий тех, кто не прошел вакцинацию. В случае уменьшения охвата населения вакцинацией те болезни, которые сейчас находятся в Норвегии под контролем (например, полиомиелит и дифтерия) могут вернуться.

Не знаете, нужна ли вам повторная доза?

Войдите в систему службы вакцинации по адресу helsenorge.no (на норвежском языке) и проверьте статус вакцинаций для себя и ваших детей до 16 лет. Поликлиника, врач общей практики или клиника вакцинации уведомят Норвежский иммунизационный реестр SYSVAK о вакцинах, предоставляемых в Норвегии в рамках Программы иммунизации в детском возрасте. Для регистрации вакцин, предоставляемых вне рамок программы, требуется согласие.

Свяжитесь со своим врачом общей практики или клиникой вакцинации выезжающих за рубеж, чтобы записаться на прием.