


HVIS ULYKKEN ER UTE

KONTAKT **GIFTINFORMASJONEN** 22 59 13 00 – HELE DØGNET



GENERELLE TILTAK



**VED BEVISSTLØSHET
OG/ELLER ANDRE ALVORLIGE SYMPTOMER**

RING 113



HUDKONTAKT Skyll straks grundig med rennende vann. Ta av tilsølt tøy, klokker og liknende. Kjemikalier som er lite løselige i vann, som for eksempel oljebaserte produkter, kan vaskes bort med såpe og vann. Ved uhell med sterkt etsende kjemikalier, for eksempel lut (avløpsåpner) er det viktig å skylle lenge.

SPRUT I ØYNE Skyll straks med rennende vann før du tar kontakt med Giftinformasjonen (fjern eventuelt kontaktlinser først). Bruk gjerne lunkent vann og myk vannstråle. Øyet bør skylles grundig, skylletid avhenger av hvilket stoff man har fått på øyet (fra minutter til timer).



INNÅNDING Dersom noen puster inn damp fra giftige kjemikalier, gass eller røyk, skal vedkommende straks komme seg ut i frisk luft. Personen bør holdes varm og i ro. Hvis den forulykkede trenger hjelp til evakueringen er det viktig at hjelperen ikke setter seg selv i fare.



SVELGING Fjern eventuelle rester fra munnen og skyll munnen. Gi noe å drikke, f.eks. melk, vann eller saft. Brekninger skal (vanligvis) ikke fremkalles og aldri når personen er bevisstløs, har kramper eller har svelget etsende stoffer eller oljebaserte produkter.

Ved inntak av etsende stoffer Skyll munnen grundig. Gi straks drikke (barn 1 dl, voksne 2 dl) – drikke skal ikke tvinges i personen. Ikke fremkall brekninger.

Medisinsk kull Rask tilførsel av kull kan i noen tilfeller redusere omfanget av en forgiftning. Kontakt Giftinformasjonen for råd.

NÅR MAN RINGER GIFTINFORMASJONEN ER DET EN FORDEL OM MAN KAN OPPGI:

- Nøyaktig navn på produkt/legemiddel
- Bruksområdet for produktet (f.eks. vindusvask)
- Navn på produsent
- Omtrent hvor mye som er svelget/sølt på hud
- Er det en konsentrert eller en fortynnet løsning?
- Når skjedde uhellet/forgiftningen?
- Har personen symptomer?

Ved kontakt med lege/sykehus bør man ta med seg innpakningen/emballasjen.

OM LEGEMIDLER OG FORGIFTNINGER Legemidler skal tas slik de er foreskrevet av lege eller slik det står anbefalt i pakningsvedlegget for reseptfrie legemidler. Når legemidler tas utover anbefalt mengde, kan det være fare for forgiftning. De ulike legemidlene har svært forskjellig forgiftningspotensiale. Enkelte legemidler kan gi forgiftninger ved ganske små feildoseringer, mens andre er mindre farlige/potente. Kontakt Giftinformasjonen for råd/veiledning dersom noen har fått i seg feil/for stor dose av legemidler.

Plakaten kan bestilles på www.giftinfo.no
Privatpersoner kan også bestille på e-post: giftinformasjonen@fhi.no



FARLIG ELLER UFARLIG?

LEGEMIDLER

Stoff- eller produktgruppe	Forgiftningsrisiko	Mulige forgiftningssymptomer/virkninger Virkningen er avhengig av mengde	Spesielle tiltak/råd KONTAKT DERETTER GIFTINFORMASJONEN
Antihistaminer	Farlig ved overdosering	Uro, sløvhets, bevisstløshet, hjertepåvirkning	
Fluorpreparater	25 mg fluorid eller 1 ss tannkrem er ufarlig	Kvalme, brekninger, diaré, kramper	Gi gjerne melk å drikke
Hjertemedisiner	Farlig ved overdosering (selv små mengder)	Lavt blodtrykk, langsom eller rask puls, hjertepåvirkning, sløvhets/bevisstløshet, pustevansker	
Hostesaft	Kan være farlig ved overdosering, spesielt de reseptpliktige	Bevisstløshet, pustevansker	
Ibuprofen	Farlig ved overdosering	Kvalme, oppkast, bevisstløshet, nyrepåvirkning	
Jerntabletter	Farlig ved overdosering	Magesmerter, kvalme, diaré, slapphet, bevisstløshet, kramper, lever- og nyrepåvirkning	
Multivitaminer – uten jern	Lite farlig (inntil 20 tabletter er ufarlig)	Kan gi kvalme, oppkast og diaré på grunn av søtningsstoffer	Vurder opphold i vitamintilskudd noen dager
Nesedråper/spray	Enkelte typer kan gi forgiftning ved overdosering. Spesielt farlig for barn under 4 måneder	Sløvhets, uro, kramper, hjertepåvirkning	Skyll nesen med morsmelk/ fysiologisk saltvann hvis tilgjengelig
Paracetamol	Farlig ved overdosering	Kvalme, brekninger, magesmerter, leverpåvirkning/svikt	
P-piller	Ett brett er ufarlig	Kvalme, brekninger	
Reisesyketabletter	Farlige ved overdosering	Uro, sløvhets, bevisstløshet, hjertepåvirkning	
Sovemedisiner	Farlige ved overdosering	Sløvhets, bevisstløshet, pustevansker	

ANNET I HJEMME- OG UTEMILJØET

Stoff- eller produktgruppe	Forgiftningsrisiko	Mulige forgiftningssymptomer/virkninger Virkningen er avhengig av mengde/konsentrasjon	Spesielle tiltak/råd KONTAKT DERETTER GIFTINFORMASJONEN
Alkohol, etanol, sprit	Farlig for barn	Sløvhets, bevisstløshet, pustevansker	Gi drikke. Skyll øyne/hud
Avfettingsmidler	Kan være farlige	Avhengig av innholdsstoffer	Gi drikke. Skyll øyne/hud
Avløpsåpnere	Svært farlige	Sterkt etsende. Blemmer, sår, brekninger, smerter, sikling, hevelse, pustebesvær	Unngå brekninger. Skyll munnen og gi straks noe å drikke. Langvarig skylling ved søl på øyne/hud. Ring 113
Batterier – Knappceller, stabatterier	Kan være svært farlige å svelge	Fare for blant annet alvorlig etseskade	Alle inntak skal følges opp
Bensin	Farlig	Se oljebaserte produkter	Gi drikke. Unngå brekninger. Skyll øyne/hud
Blomstergjøding/hagegjødning	Lite farlig	Som regel ingen symptomer	Gi drikke
Blyanter/fargestifter til barn	Ufarlig	Ingen symptomer	Ingen behandling nødvendig
Brannslukningsapparat – pulver	Lite farlig	Hoste, pustevansker	Gi drikke. Skyll øyne/hud. Frisk luft og hvile
Bremsevæske til bil	Svært farlig	Bevisstløshet, nyrepåvirkning, pustevansker	Viktig å følge opp alle inntak. Gi drikke. Skyll øyne/hud
Desinfeksjonsmidler: – Sårbehandling – Andre desinfeksjonsmidler	Lite farlige ved små inntak Kan være svært farlige	Kvalme og oppkast Avhengig av innholdsstoffer	Gi drikke. Skyll øyne Skyll munnen og gi drikke. Skyll øyne/hud
Duftolje/eteriske oljer	Kan være svært farlige	Irritasjon av munn og svelg, bevisstløshet, kramper	Gi drikke. Skyll øyne/hud
Eddikessens 35 %	Svært farlig	Sterkt etsende. Blemmer, sår, brekninger, smerter, sikling, hevelse, pustebesvær	Unngå brekninger. Skyll munnen og gi straks noe å drikke. Langvarig skylling ved søl på hud/øyne. Ring 113.
Flekkjernere	Kan være farlige	Avhengig av innholdsstoffer	Skyll munnen og gi drikke. Skyll øyne/hud
Frostvæske	Svært farlig	Bevisstløshet, nyrepåvirkning, pustevansker	Viktig å følge opp alle inntak. Gi drikke. Skyll øyne/hud
Fyrstikker	Lite farlig. 20 fyrstikkhoder er ufarlig	Kvalme, magesmerter	Ingen behandling nødvendig hvis 20 fyrstikkhoder er spist
Grill- og ovnsrens	Kan være svært farlige	Sterkt etsende. Blemmer, sår, brekninger, smerter, sikling, hevelse, pustebesvær	Se avløpsåpnere
Grønnsåpe	Vanligvis lite farlig	Irriterer slimhinner	Gi drikke. Skyll øyne/hud
Gulvvaskeprodukter (til husholdningsbruk)	Lite farlig å smake på	Irriterer slimhinner	Gi drikke. Skyll øyne/hud
Hudkrem/lotion/solkrem	Ufarlig	Ingen symptomer ved små inntak	Gi drikke
Husvask/terraserens (Sopp- og algedreper)	Kan være svært farlige/etsende	Avhengig av innholdsstoffer	Skyll munnen og gi drikke. Skylling ved søl på øyne/hud
Håndåpe/dusjåpe/hårjampo	Lite farlig	Kvalme og oppkast	Gi drikke. Skyll øyne
Hårstylingprodukter	Lite farlige ved små inntak	Irriterer slimhinner og øyne	Gi drikke. Skyll øyne/hud
Hagekalk, vanlig (dolomittkalk)	Ufarlig	Ingen symptomer ved små inntak	Gi drikke
Kaustisk soda	Svært farlig	Sterkt etsende. Blemmer, sår, brekninger, smerter, sikling, hevelse, pustebesvær	Se avløpsåpnere
Klorbaserte vaske-/blekemidler	Farlige	Irriterende til etsende	Skyll munnen og gi drikke. Skyll øyne/hud
Lim: – Papirlim – Kontaktlim	Ufarlig Kan være farlig	Ingen symptomer Ved svelging eller innånding av større mengder damp: svimmelhet, kvalme, hodepine, bevisstløshet, hjertepåvirkning	Fjern rester og gi drikke. Skyll øyne/hud Fjern rester og gi drikke. Skyll øyne/hud. Ved innånding: frisk luft og hvile
– Superlim/lynlim	Små inntak er lite farlig. Fare ved søl i øyne.	Kan gi øyeskader	Gi drikke. Skyll øyne/hud
Lut	Svært farlig	Sterkt etsende. Blemmer, sår, brekninger, smerter, sikling, hevelse, pustebesvær	Se avløpsåpnere
Lysstaver, selvløsende armbånd o.l.	En liten smak er sjelden farlig	Irritasjon i munn, kvalme, oppkast	Gi drikke. Skyll øyne/hud
Maling, lakk og beis (gjelder ikke kunstnermaling): – Vannbasert – Andre	Lite farlig ved små inntak Kan være farlige	Irriterer slimhinner Avhengig av innholdsstoffer	Fjern rester og gi drikke. Skyll øyne/hud Fjern rester og gi drikke. Skyll øyne/hud
Maling- og lakkjernere	Kan være svært farlige/etsende	Avhengig av innholdsstoffer	Skyll munnen og gi drikke. Skyll øyne/hud
Metanol (bl.a. modellflydrivstoff)	Svært farlig	Bevisstløshet, synsforstyrrelser, pustevansker	Viktig å følge opp alle inntak. Gi drikke. Skyll øyne/hud
Neglelakk/neglelakkjernere med aceton/etylacetat	En liten slurk (< 10 ml) er ikke farlig	Sløvhets, bevisstløshet, pustevansker	Gi drikke. Skyll øyne/hud
Nikotin: – Sigaretter – Snus – E-sigarettvæske	Inntil 1 sigarett til små barn er lite farlig Inntak av en pris er lite farlig Kan være svært farlig.	Kvalme, brekninger, magesmerter, blekhet, bevisstløshet, kramper. Symptomer opptrer gjerne innen en time Kvalme, brekninger, magesmerter, blekhet, bevisstløshet, kramper. Symptomene kan drøye noen timer Selv små inntak kan raskt gi alvorlige symptomer, avhenger av innholdsstoffer og konsentrasjoner.	Fjern rester fra munnen. Skyll munnen og gi drikke Fjern rester fra munnen. Skyll munnen og gi drikke Skyll munn, gi drikke. Ring 113
Oljebaserte produkter (tennvæske, lampeolje mm.)	Farlige	Ved små inntak: fare for alvorlig lungepåvirkning hvis det kommer over i luftveiene. Ved større inntak også fare for sløvhets, bevisstløshet	Gi drikke. Unngå brekninger. Skyll øyne/hud
Opprenningsbriketter	Lite farlig	Irriterende	Fjern rester fra munnen og gi drikke
Oppvaskmiddel (til husholdningsbruk) – Flytende håndoppvask – Pulver/tabletter til maskin	Lite farlig Sterkt irriterende	Kvalme, oppkast og diaré Kvalme, oppkast og diaré. I enkelte tilfeller etseskade	Gi drikke. Skyll øyne/hud Fjern rester fra munnen. Skyll munnen og gi drikke. Skyll øyne/hud
Parfyme	En liten smak er ikke farlig	Sløvhets, bevisstløshet, pustevansker	Gi drikke. Skyll øyne
Rustjernere	Kan være farlige	Avhengig av innholdsstoffer	Gi drikke. Unngå brekninger. Skyll øyne/hud
Rødsprit	Farlig	Sløvhets, bevisstløshet, pustevansker	Gi drikke. Skyll øyne/hud
Salmiak	Farlig	Etsende	Se avløpsåpnere
Sement	Kan være farlig, spesielt for øyne	Irriterende til etsende, kan gi alvorlig øyeskade	Skyll munnen og gi drikke. Skyll/vask hud. Langvarig skylling av øyne
Silikagel	Ufarlig	Ingen symptomer	Ingen behandling nødvendig
Skyllmidler, tøyrennere	Lite farlige ved små inntak	Irriterer slimhinner, kvalme, brekninger	Gi drikke. Skyll øyne/hud
Tennvæske	Farlig	Se oljebaserte produkter	Se oljebaserte produkter
Ugress- og plantevernmidler	Kan være svært farlig	Avhengig av innholdsstoffer og konsentrasjon	Gi drikke. Skyll øyne/hud
Vaskemidler til klær: – Pulver og flytende	Lite farlige ved små inntak Kan være farlig	Irriterer slimhinner Sløvhets, bevisstløshet, pustevansker	Fjern ev rester og gi drikke. Skyll øyne/hud Gi drikke. Skyll øyne/hud
Vindusspylervæske	Farlig	Se oljebaserte produkter	Se oljebaserte produkter
White spirit	Farlig	Se oljebaserte produkter	Se oljebaserte produkter