# Pneumokoki

## Kto powinien otrzymać szczepionkę przeciwko pneumokokom?



- Wszyscy, którzy mają 65 lat lub więcej.
- Dorośli w wieku 18–64 lat, którzy cierpią na poważne choroby.

Porozmawiaj z lekarzem, jeśli nie masz pewności, czy dotyczy to Ciebie. **Jeśli kończysz w tym roku 65 lat, możesz otrzymać szczepionkę po obniżonej cenie.**

## Jak działa szczepionka przeciwko pneumokokom?

- Szczepionka uczy organizm bronić się przed bakterią pneumokokową.
- Szczepionka podawana jest w postaci zastrzyku w ramię. Może być podana jednocześnie ze szczepionką przeciwko koronawirusowi i grypie.
- Szczepionka zaczyna działać po 1–2 tygodniach.

## Co dzieje się po szczepieniu?

- U wielu osób w miejscu wkłucia pojawia się ból, zaczerwienienie lub obrzęk.
- U niektórych może wystąpić gorączka, bóle mięśni, uczucie złego samopoczucia lub zmęczenie. Objawy te zwykle ustępują samoistnie po kilku dniach.
- Jeśli masz wątpliwości lub obawy dotyczące ewentualnych dolegliwości po szczepieniu, skontaktuj się z lekarzem.

Przeczytaj więcej na stronie
fhi.no/voksenvaksinasjon

FHI