

	Influenzavaksine		Pneumokokkvaksine		Koronavaksine	
	VVP	Anbefaling utenom VVP	VVP	Medisinsk anbefaling utenom VVP	VVP	Anbefaling utenom VVP
Inkluderte grupper	- Beboere i omsorgsbolig og sykehjem 65 år og eldre - Voksne og barn med definerte risikotilstander og sykdommer - Gravide etter 12. svangerskapsuke, samt alle gravide som inngår i risikogruppe - Prematurt fødte barn fra 6 måneder til 5 års alder	- Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter - Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar - Yrkesvaksinering (kontakt med levende griser, mistenkt eller bekreftet influensasjuk tamfugl)	65-åringer (personer født i 1960 eller senere fra det kalenderåret de fyller 65 år)	- Alle født før 1960 - Personer med definerte risikotilstander og sykdommer	- Beboere i omsorgsbolig og sykehjem 75 år og eldre 65-74 år* 18-74 år med definerte risikotilstander og sykdommer 12-17 år med alvorlig grunnsykdom 6-måneder 11 år med alvorlig grunnsykdom individuell vurdering	Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
Vaksine	- Influvac - Vaxigrip - Fluad (f.o.m. 50 år) til beboere i sykehjem og omsorgsbolig, og særskilt skrøpelige hjemmeboende - Fluenz (f.o.m. 2 år t.o.m. 17 år, OBS: levende nesepressvaksine)	- Influvac - Vaxigrip - Fluenz (f.o.m. 2 år t.o.m. 17 år, OBS: levende nesepressvaksine) - Fluarix - Efluelda (bare i apotek)	Prevenar 20	- Pneumovax - Prevenar 20 - Capvaxive	Comirnaty LP.8.1 (flerdose hetteglass á 30 µg/dose, 10 µg/dose, og 3 µg/dose)	Comirnaty LP.8.1 (ferdigfylt én-dose sprøyte á 30 µg i 10-pakninger) For barn: Comirnaty LP.8.1 (flerdose hetteglass á 10 µg/dose, og 3 µg/dose)
Ordineringsrett	- Lege - Helsesykepleier - Farmasøyt i apotek - Sykepleier	- Lege - Farmasøyt i apotek	- Lege - Helsesykepleier	Lege	- Lege - Helsesykepleier - Farmasøyt - Sykepleier	Lege