


Comirnaty (BioNTech og Pfizer)

JN. 1 injeksjonsvæske, dispersjon (grått lokk)
– **SKAL IKKE FORTYNNES**




Voksne og ungdom fra 12 år: 30 µg/dose

KLARGJØRING

- Vaksinasjon av **voksne og ungdom fra 12 år**: Lokket på hetteglasset er **grått**.
NB! Denne vaksinen **skal IKKE fortynnes** med NaCl. Hver dose er **30 µg**.
- Tidspunkt for uttak fra ultrafryser og kjøleskap må følge hvert hetteglass (ikke notér på glasset).
- Vend romtemperert hetteglass med Comirnaty forsiktig 10 ganger, **ikke rist**.
- Etter vending skal vaksinen fremstå som en hvit til off-white dispersjon uten synlige partikler. Inspiser vaksinen før bruk, og kassér den hvis misfarging eller synlige partikler forekommer.

Forsiktig x10



OPPTREKK


- Dosestørrelse **0,3 ml**.
- Hvert hetteglass gir **6 doser** dersom sprøyter og/eller kanyler med lavt dødvolume benyttes (<0,035 ml). Opptrekk >6 doser er off-label-bruk og må godkjennes av ansvarlig lege.
- Kanyler til intramuskulær injeksjon må vurderes ut fra pasientens størrelse og kroppsvekt (21G eller 23G).
- Opptrekkskanyler med filter skal **ikke** brukes.

Bytte av kanyler mellom opptrekk og injeksjon (ved opptrekk av mange doser samtidig)

- Desinfiser membranen på hetteglasset og la den tørke.
- Koble på 21G kanyler på 1 ml sprøyte.
Dersom du skal bytte til 21G kanyler:
Trek opp 0,30 ml; trekk deretter luft opp i sprøyten med kanylen fremdeles i hetteglasset for å sikre at vaksinen i dødvolume kommer med.
- Koble sprøyten fra opptrekkskanylen og la kanylen stå i hetteglasset.
- Dersom du skal bytte til 23G kanyler:**
Trek opp 0,33-0,35 ml vaksine.
- Koble til egnet kanyler for intramuskulær injeksjon (avhengig av pasientens størrelse) på sprøyten.
- Fyll dødvolume og juster til 0,30 ml.
- Gjenta prosedyren ved å koble en ny sprøyte på opptrekkskanylen i hetteglasset.
- Ved opphold mellom opptrekk må kanylen fjernes fra hetteglasset for å unngå kontaminasjon.

Bruk av samme kanyler til opptrekk og injeksjon

- Desinfiser membranen på hetteglasset og la den tørke.
- Koble egnet kanyler for intramuskulær injeksjon på 1 ml sprøyte (maks. størrelse 21G).
- Trek opp 0,30 ml vaksine. Dødvolume skal være fylt.



Dødvolume = volum inni kanyler og tomrom mellom kanyler og sprøytetupp

HOLDBARHET

Etter opptining (uåpnede hetteglass):

- 2-8°C: Inntil 10 uker.
- Romtemperatur (maks. 30°C): Inntil 12 timer.

Etter første punksjon av membranen på hetteglasset (2-30°C):

Inntil 12 timer forutsatt at arbeidsmetoden hindrer tilføring av mikrober.

Etter opptrekk i sprøyte: Skal brukes snarest mulig, fortrinnsvis innen 60 minutter.

- Registrer tidspunkt for første punksjon av membranen på glasset.**
- Vaksinerester fra ulike hetteglass skal **ikke** blandes.

