Samtykkeskjema for foresatte

Influensavaksinering av barn og ungdom under 16 år

Influensa er en vanlig infeksjonssykdom blant barn. De aller fleste barn tåler å være influensasyke, men infeksjonen kan for noen få føre til blant annet alvorlig lungebetennelse og forverring av underliggende sykdom. Ved alvorlig influensasykdom eller komplikasjoner er sykehusinnleggelse nødvendig.

Som for voksne, har barn med enkelte sykdommer noe høyere risiko for å bli alvorlig syk av influensa. Dette gjelder også for tidlig fødte barn fram til fylte 5 år. Disse risikogruppene anbefales årlig influensavaksine.

For barn omfatter dette:

- Kronisk hjerte- eller lungesykdom (inkludert astma)
- Kronisk nevrologisk sykdom eller skade (for eksempel epilepsi)
- Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling
- Lever- eller nyresvikt
- Diabetes (spesielt ved dårlig regulert blodsukkernivå)
- Svært alvorlig fedme
- Annen alvorlig/kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
- For tidlig fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) opp til 5 år.

Influensavaksiner til barn

Influensavaksine er det beste tiltaket for å forebygge influensa. Vaksinen settes årlig fordi influensavirusene stadig utvikler seg, og fordi vaksinen har begrenset varighet. Influensavaksinene har vært i bruk i mange år og vi har god kunnskap om hvilke bivirkninger som kan oppstå. Vaksinene gir svært sjelden alvorlige bivirkninger. Bivirkningene består i hovedsak av lokalreaksjoner eller kortvarig sykdomsfølelse som vondt i muskler eller lett feber. Det finnes i dag to typer influensavaksine godkjent for barn i Norge, inaktivert injeksjonsvaksine (sprøyte) og levende, svekket nesesprayvaksine (Fluenz).

Inaktivert injeksjonsvaksine

Godkjent fra 6 måneder. Kontraindikasjoner omfatter alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine, alvorlige umiddelbare allergiske reaksjoner mot egg, kjent allergi mot andre innholdsstoffer i vaksinen, og akutt infeksjon med feber over 38 °C.

Levende svekket nesesprayvaksine

Godkjent for 2-17 år. Kontraindikasjoner omfatter alvorlig astma eller aktivt pustebesvær, bruk av acetylsalisylsyrepreparater, ubehandlede craniofaciale misdannelser, klinisk immunsvikt, alvorlig allergi mot innholdsstoffer i vaksinen, og akutt infeksjon med feber over 38 °C.

For barn 6 måneder til 9 år som ikke har hatt influensa eller har fått influensavaksine tidligere, er det anbefalt med to doser influensavaksine med minimum 4 ukers intervall. Du kan lese mer om vaksinene på www.fhi.no/voksenvaksinasjon.

Før vaksinasjon

Vaksinering er frivillig. De som ikke har fylt 16 år, må ha samtykke fra foresatte. Ved felles foreldreansvar må begge foresatte samtykke. Også barn under 16 år har rett til å få informasjon og skal høres ut fra alder og modenhet. Gi beskjed dersom barnet tidligere har hatt alvorlig allergisk reaksjon på influensavaksine eller akutte allergiske reaksjoner mot egg.

Personer som har hatt alvorlig straksallergisk reaksjon/anafylaktisk sjokk etter inntak av eggeprotein, eller har hatt alvorlig straksallergisk reaksjon mot tidligere dose av influensavaksine eller annet agens, bør vaksineres under utvidet anafylaksiberedskap dersom de har behov for influensavaksine.

Klipp her

Barnets navn:	Fødselsdato:

Jeg/vi ønsker at barnet mitt/vårt skal vaksineres mot influensa: ☐ Ja ☐ Nei

Foresatte med foreldreansvar:

Foresatt 1:

Fullt navn (skriv tydelig): _____

Underskrift: _____

Telefonnummer: _____

Foresatt 2:

Fullt navn (skriv tydelig): _____

Underskrift: _____

Telefonnummer: _____

Relevant helseinformasjon om barnet:
