

6 أسابيع وخزة 1*	فيروس الروتا (لقاح مشروب، دون وخز) *الأطفال من أبوين قادمين من بلد ترتفع فيه نسبة تفشي الإصابة بالسل: السل (لقاح بي سي جي BCG) *الأطفال الخدج المولودين قبل أسبوع الحمل 32: الخناق (الدفتيريا) • الكزاز • السعال الديكي • شلل الأطفال • عدوى المستدمية النزلية • التهاب الكبد بي B
3 أشهر وخزتان	فيروس الروتا • الخناق (الدفتيريا) • الكزاز • السعال الديكي • شلل الأطفال • عدوى المستدمية النزلية • التهاب الكبد بي B • المكورات الرئوية
5 أشهر وخزتان	الخناق (الدفتيريا) • الكزاز • السعال الديكي • شلل الأطفال • عدوى المستدمية النزلية • التهاب الكبد بي B • المكورات الرئوية
12 شهراً وخزتان	الخناق (الدفتيريا) • الكزاز • السعال الديكي • شلل الأطفال • عدوى المستدمية النزلية • التهاب الكبد بي B • المكورات الرئوية
15 شهراً وخزة 1	الحصبة • التكايف • الحصبة الألمانية

قبل اللقاح وبعده

أبلغ ممرضة الصحة إذا

- كان لدى الطفل حساسية أو مشاكل صحية أخرى
- إن تناول الطفل مؤخراً أدوية أو تلقى لقاحات أخرى
- كانت الأم تتناول أدوية تضعف جهاز المناعة خلال الحمل و/أو أثناء قيامها بالرضاعة

بعد اللقاح ينبغي للمرء الانتظار لمدة 20 دقيقة قبل مغادرة مركز الرعاية الصحية. معظم الأطفال يشعرون بقدر قليل من ردود الفعل أو لا يشعرون بشيء بعد تلقى اللقاح، إلا أن البعض يشعر بردود فعل خفيفة وعابرة، مثل الحمى الخفيفة. إن أصيب الطفل بالحمى تتجاوز 39 درجة مئوية و/أو هبوط في الوضع الصحي العام، فقد يكون ذلك علامة على مرض جدية وقد يكون ذلك بسبب رد الفعل على اللقاح. ولذلك اتصل بالطبيب إن كنت قلقة على الطفل.

اللقاح المركب

اللقاح المركب يمنح وقاية من عدة أمراض في حقنة واحدة. معظم اللقاحات في البرنامج تُمنح بهذه الطريقة. وهذا يعني وخزات أقل بالنسبة للطفل ويؤدي إلى ردود فعل أقل في موضع الوخز، مما يحصل عند تلقى اللقاحات كل على حدة.

برنامج لقاح الأطفال في العمر الدراسي

وخلال المدرسة الابتدائية يتلقى الطفل عروضا بجرعات منتظمة من بعض اللقاحات. في الصف 7، يُعرض تلقى اللقاح المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري (أتش بي في HPV).

لائحة بنوع اللقاحات التي تلقاها طفلك

جميع اللقاحات التي يتلقاها طفلك، تُسجل في السجل الوطني للقاحات SYSVAK. اللائحة العامة للقاحات الطفل تجدونها في مركز خدمات اللقاح على موقع www.helsenorge.no