

6 semanas 1 inyección*	Rotavirus (vacuna oral, sin inyección) *Niños(as) cuyos progenitores proceden de países con una incidencia alta de tuberculosis: Tuberculosis (vacuna BCG) *Bebés prematuros nacidos antes de la semana 32 de gestación: Difteria • Tétanos • Tosferina • Poliomielitis • Infección por Hib • Hepatitis B
3 meses 2 inyecciones	Rotavirus • Difteria • Tétanos • Tosferina • Poliomielitis • Infección por Hib • Hepatitis B • Enfermedad neumocócica
5 meses 2 inyecciones	Difteria • Tétanos • Tosferina • Poliomielitis • Infección por Hib • Hepatitis B • Enfermedad neumocócica
12 meses 2 inyecciones	Difteria • Tétanos • Tosferina • Poliomielitis • Infección por Hib • Hepatitis B • Enfermedad neumocócica
15 meses 1 inyección	Sarampión • Paperas • Rubeola

Antes y después de la vacunación

Informe al(a) enfermero(a) de salud pública si:

- El(la) niño(a) tiene alergias u otros problemas de salud
- El(la) niño(a) ha recibido recientemente medicamentos u otras vacunas
- La madre ha recibido medicamentos que merman el sistema inmunológico durante el embarazo y/o en el período de lactancia

Tras la vacunación, debe esperar 20 minutos antes de abandonar el centro de salud. La mayoría de los(las) niños(as) desarrollan escasa o ninguna reacción a una vacunación, aunque algunos pueden desarrollar leves reacciones transitorias, como algo de fiebre. Si el(la) niño(a) desarrolla una fiebre superior a 39 °C o muestra un deterioro de su estado general, esto puede ser síntoma de una enfermedad grave y no necesariamente una reacción a la vacuna. Por esa razón, póngase en contacto con su médico(a) si le preocupa el(la) niño(a).

Vacunas combinadas

Las vacunas combinadas proporcionan protección contra varias enfermedades en una única inyección. La mayoría de las vacunas del programa se administran de esta forma. Esto significa menos inyecciones para el(la) niño(a) y menos reacciones en el lugar de la inyección que si se aplicaran las vacunas por separado.

Programa de inmunización para niños(as) en edad escolar

A los(as) niños(as) en edad escolar se les ofrecerán dosis de refuerzo de determinadas vacunas. A los niños de 7.º curso (12-13 años), se les ofrecerá una vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH).

Lista de las vacunas recibidas por un(a) niño(a)

Todas las vacunas administradas a un(a) niño(a) se registran en el registro electrónico de inmunización noruego SYSVAK. La información acerca de las vacunaciones infantiles puede encontrarse en el Servicio de vacunas en www.helsenorge.no.