

Om ukerapporten

Her følger siste ukes resultater fra Symptometer.


De ukentlige spørreskjemaene sendes til deltagerne på mandager. Det ble ikke sendt ut skjema i sommerukene 26 – 29 i 2021, ukene 29, 30 og 51 i 2022, samt 29 og 30 i 2023.

For uke 2023-39 var det 4337 personer (17 % av deltagerne) som hadde besvarte ukeskjemaet. For uke 2023-40 var det kl. 12 11. oktober 2023 3857 personer (15 % av deltagerne) som hadde besvart ukeskjemaet.

Forekomst av symptomer i befolkningen

Figurene under viser estimert forekomst i befolkningen i Norge, og fordelt på fylker og de mest folkerike kommunene for henholdsvis forkjølelssymptomer (definert som minst ett av følgende symptomer: hoste, sår hals, tungpustethet eller rennende nese) og feber i kombinasjon med hoste.


Figur 1. Utvikling av forkjølelssymptomer og feber i kombinasjon med hoste for ukene 2020-45 til 2023-40 fordelt i Norge.



Sist oppdatert: 2023-10-11


Figur 2.1. Kartet viser estimert prevalens av forkjølelssymptomer i befolkningen per fylke i uke 40. Forkjølelssymptomer er definert som minst en av følgende symptomer: hoste, sår hals, tungpustethet eller rennende nese.

Forkjølelssymptomer
Uke 2023-40




Sist oppdatert: 2023-10-11

Figur 2.2. Utvikling av forkjølelssymptomer for siste 10 uker fordelt på fylker.




Sist oppdatert: 2023-10-11

Figur 2.3. Utvikling av forkjølelssymptomer for ukene siste 10 uker fordelt på de mest folkerike kommunene.



Figur 2.4 Kartet viser estimert prevalens av feber i kombinasjon med hoste i befolkningen per fylke i uke 40.


Hoste og feber
Uke 2023-40



Covid-19 prøveresultater


Blant deltakerne i Symptometer oppga 23620 (63 %) at de har blitt testet for koronavirus minst én gang i perioden fra august 2021 og frem til nå. Av alle testene ble det påvist koronavirus i 15 prosent (12848) av tilfellene, mens det i 75 prosent (62812) av testene ikke ble påvist koronavirus. For de resterende testene var testsvarene ikke klare da undersøkelsen ble besvart.

Figur 3.1. Estimert prosentandel som tester seg for koronavirus siden august 2021, og hvilken type test de har tatt. Fra og med uke 2021-40 foreligger opplysninger om type test.




Sist oppdatert: 2023-10-11

Figur 3.2. Prosentandel blant respondenter som oppgir å ha fått påvist koronavirus i ukene 2021-30 til 2023-40, fordelt på type test. Fra og med uke 2021-40 foreligger opplysninger om type test.




Sist oppdatert: 2023-10-11

Figur 3.3. Prosentandel blant de som har oppgitt å ha testet seg som oppgir å ha fått påvist koronavirus i ukene 2021-30 til 2023-40, fordelt på type test. Fra og med uke 40/2021 foreligger opplysninger om type test.



Sist oppdatert: 2023-10-11

Figur 3.4. Prosentandel av respondenter som siden august 2020 har oppgitt ulike symptomer fordelt etter negativt eller positivt prøveresultat.



Sist oppdatert: 2023-10-11

Tabell 1. Symptomer fordelt etter prøveresultat (antall respondenter siden august 2020) og prosentandel positive per symptom.


Symptom	Negativ	Positiv	ProsentPositiv
Endret smak- og luktesans	1 731	2 831	62,1
Hoste og feber	4 232	5 700	57,4
Muskel- eller leddsmerter	5 294	5 931	52,8
Feber	6 885	7 324	51,5
Svimmel	2 841	2 873	50,3
Appetittmangel	3 372	3 285	49,3
Brystsmerter	1 621	1 516	48,3
Tungpustet	4 673	3 884	45,4
Hodepine	8 767	6 923	44,1
Sliten eller utmattet	12 231	8 901	42,1
Hoste	11 789	8 572	42,1
Røde øyne	1 500	1 084	42,0
Utslett	619	429	40,9
Diaré	2 106	1 439	40,6
Kvalme eller oppkast	2 004	1 305	39,4
Magesmerter	2 298	1 476	39,1
Rennende nese	12 686	8 123	39,0
Sår hals	11 410	7 082	38,3
Forkjølelsessymptomer	18 761	10 770	36,5
Minst ett symptom	23 476	11 852	33,5

Begrunnelse for testing

Tabell 2. Begrunnelse for testing basert på prøveresultat og sannsynligheten for å få et positivt resultat. Basert på respondenters svar siden august 2020.

Testgrunn	Negativ	Positiv	% Positiv (CI)
Symptom	19 442	8 743	13,02 (12,77, 13,28)
Kontakt med smittet	11 950	5 225	7,78 (7,58, 7,99)
Eget ønske	15 324	2 694	4,01 (3,87, 4,16)
Arbeidssituasjon	10 030	1 176	1,75 (1,65, 1,85)
Har vært i utlandet	4 366	638	0,95 (0,88, 1,03)
Deltakelse på arrangement	2 218	270	0,56 (0,49, 0,63)
Helseplage	2 119	340	0,51 (0,45, 0,56)
Annet	3 152	265	0,39 (0,35, 0,45)
Anbefalt fra helsepersonell	2 119	170	0,25 (0,22, 0,29)
Skal til utlandet	763	77	0,16 (0,13, 0,20)
Anbefalt fra Smittestopp	390	70	0,10 (0,08, 0,13)
Studier eller skolegang	138	25	0,05 (0,03, 0,08)

Figur 4. Prosentandel (95% konfidensintervall) for begrunnelse for testing fordelt etter negativt eller positivt prøveresultat. Basert på respondenters svar siden august 2020.




Sist oppdatert: 2023-10-11

Symptomprevalens og testresultat


Basert på det respondentene har rapportert om symptomer, testaktivitet og testresultat kan vi sammenligne forekomsten av enkelte symptomer hos de som fikk påvist koronavirus mens deltavarianten var dominerende med forekomsten av symptomer hos de som fikk påvist koronavirus når omikronvarianten ble dominerende.

Figur 5.1. Andel av dem som har fått påvist koronavirus som har rapportert endret smak- og luktesans i periodene fra uke 2021-31 t.o.m. uke 2021-48 (periode da delta-variant var dominerende) og f.o.m. 49-2021 til uke 2023-40 (periode da omikron-variant var dominerende).




Sist oppdatert: 2023-10-11

Figur 5.1. Andel av dem som har fått påvist koronavirus som har rapportert forkjølelsessymptomer i periodene fra uke 2021-31 t.o.m. uke 2021-48 (periode da delta-variant var dominerende) og f.o.m. 49-2021 til uke 2023-40 (periode da omikron-variant var dominerende).



Sist oppdatert: 2023-10-11

Figur 5.1. Andel av dem som har fått påvist koronavirus som har rapportert feber i kombinasjon med hoste i periodene fra uke 2021-31 t.o.m. uke 2021-48 (periode da delta-variant var dominerende) og f.o.m. 49-2021 til uke 2023-40 (periode da omikron-variant var dominerende).



Sist oppdatert: 2023-10-11