


Вакцина от коронавируса

Коронавирус вызывает респираторные заболевания. У многих людей симптомы отсутствуют или незначительны, но у некоторых заболевание протекает тяжело. Вакцина от коронавируса предотвращает серьёзные осложнения и летальный исход.



Вакцина от коронавируса рекомендуется:

- если вам 75 лет или больше;
- если вы живёте в доме престарелых;
- если вам от 18 до 74 лет и вы относитесь к группе риска;
- детям с серьёзными заболеваниями

Здоровые люди в возрасте 65-74 лет по желанию также могут пройти вакцинацию от коронавируса по сниженной цене.

К группе риска относятся люди с определёнными заболеваниями или состояниями, повышающими риск серьёзного течения коронавируса. Если вы не уверены в том, относитесь ли вы или ваш ребёнок к группе риска, вы можете прочитать более подробную информацию на сайте норвежского института народного здравоохранения fhi.



Подробнее на сайте
fhi.no/voksenvaksinasjon

по или проконсультироваться со своим врачом. Защита, полученная в результате предыдущих вакцинаций или перенесённого заболевания, со временем будет ослабевать. Поэтому норвежский институт народного здравоохранения рекомендует людям, находящимся в группе риска по развитию тяжёлой формы коронавируса, повторно вакцинироваться перед зимним сезоном.

Можно ли вводить данную вакцину одновременно с другими вакцинами?

Да, вакцину от коронавируса можно вводить одновременно с обычной вакциной от гриппа и пневмококковой инфекции.

Насколько эффективна вакцина?

Вакцина обеспечивает надёжную защиту от тяжёлой формы коронавируса, но даёт только краткосрочную защиту от заражения или передачи инфекции.

Есть ли у вакцины побочные действия?

Все лекарственные препараты и вакцины могут вызывать побочные

действия, но они возникают не у всех. Большинство побочных действий возникают в первые несколько дней после вакцинации, чаще всего имеют лёгкую или умеренную степень выраженности и проходят через несколько дней. У некоторых могут возникнуть более тяжёлые симптомы. Наиболее частыми побочными действиями являются болезненность и припухлость в месте укола, сонливость, головная боль, диарея, боль в мышцах, озноб, слабость, боль в суставах и повышенная температура. Серьёзные побочные действия встречаются редко. Органы здравоохранения непрерывно отслеживают возможные побочные действия всех вакцин.

Где можно вакцинироваться?

См. информацию на сайте вашего муниципалитета о том, как и когда проводится вакцинация.

Требуется более подробная информация?

Обратитесь к своему врачу или другим медработникам.