

Vaksine mot koronavirus

Koronaviruset gir sykdom i luftveiene. Mange får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. Koronavaksine forebygger alvorlig sykdom og død.



Ny dose koronavaksine anbefales dersom du:

- er 65 år eller eldre
- bor på sykehjem
- er mellom 18-64 år og tilhører en risikogruppe
- eller er gravid

Med risikogruppe menes personer som har enkelte sykdommer eller tilstander som gir økt risiko for å bli alvorlig syk av korona. Er du usikker på om du er i en risikogruppe, kan du lese mer på fhi.no eller spørre legen din.

Beskyttelsen du har oppnådd etter tidligere vaksinedoser eller gjennomgått sykdom vil avta over tid. FHI anbefaler derfor at de som er mest utsatt for alvorlig koronasykdom tar en ny dose før vintersesongen 23/24.

Kan vaksinen gis samtidig med andre vaksiner?

Ja, koronavaksinen kan gis samtidig med vanlig influensavaksine. Vaksinene gis i hver sin arm.

Hvor godt virker vaksinen?

Vaksinen gir god beskyttelse mot alvorlig koronasykdom. Vaksinen beskytter ikke fullstendig mot å bli smittet eller smitte videre.

Har vaksinen bivirkninger?

Alle legemidler og vaksiner kan gi bivirkninger, men det er ikke alle som får det. De fleste bivirkningene oppstår de første dagene etter vaksinasjon og er oftest milde til moderate og går over etter noen dager.

Noen kan få kraftigere symptomer. De vanligste bivirkningene er smerte og hevelse på stikkstedet, tretthet, hodepine, diaré, muskelsmerter, frysninger, utmattelse, leddsmerter og feber. Alvorlige bivirkninger er sjeldne. Blant sjeldne bivirkninger er kraftige menstruasjonsblødninger, hjertemuskelbetennelse (myokarditt) og hjerteposebetennelse (perikarditt).

Helsemyndighetene har kontinuerlig overvåkning av mulige bivirkninger for alle vaksiner.

Hvor kan du vaksinere deg?

Se informasjon på nettsiden til din kommune om hvordan og når vaksinerings gjennomføres.

Vil du vite mer?

Spør gjerne legen din, eller annet helsepersonell.



Les mer på
fhi.no/voksenvaksinasjon