

NEO: Spesifikke neonatal kasusdefinisjoner

Sett kryss ¹	NEO-CSEP: Klinisk sepsis
	Alle de tre følgende kriterier
	Lege har startet relevant antibiotikabehandling for sepsis med varighet minst 5 dager
	Ingen påvisning av patogene mikroorganismer i blodkultur eller ikke testet
	Ingen tydelige tegn på infeksjon annet sted
	<i>Og</i>
	To av de følgende kriterier (uten annen åpenbar årsak):
	Feber (>38 ⁰ C) eller ustabil temperatur (hyppig justering av kuvøsen) eller hypotermi (<36.5 ⁰ C)
	<i>Og</i>
	Takycardi (> 200/min) eller ny/økt bradycardi (< 80/min)
	Kapillær refyllingstid (CRT) >2s
	Ny eller økt apnoe (s) (> 20s)
	Uforklarlig metabolsk acidose
	Nyoppstått hyperglykemi (> 140 mmol/l)
	Andre tegn på sepsis (hudfarge (bare hvis CRT ikke er benyttet), laboratorietegn (CRP, interleukin), økt oksygenbehov (intubering), ustabil allmenntilstand, apati)

¹ Sett kryss der hvor pasienten har symptomer i henhold til kasusdefinisjonen på registreringstidspunktet.

Sett kryss ¹	NEO-LB-BBI: Laboratiebekreftet blodbaneinfeksjon (BBI)
	Minst to av:
	Temperatur > 38 ⁰ C eller <36,5 ⁰ C eller ustabil temperatur
	Takycardi eller bradycardi
	Apnoe
	Forlenget kapillær refyllingstid (CRT)
	Metabolsk acidose
	Hyperglykemi
	Andre tegn på BBI så som apati
	<i>Og</i>
	En kjent patogen mikroorganisme annet enn koagulasenegative stafylokokker dyrket fra i blod eller spinalvæske ²

¹ Sett kryss der hvor pasienten har symptomer i henhold til kasusdefinisjonen på registreringstidspunktet.

Sett kryss¹	NEO-KNSB: Laboratoriebekreftet BBI med koagulasenegative stafylokokker (KNS)
	Minst to av:
	Temperatur > 38 ⁰ C eller < 36,5 ⁰ C eller ustabil temperatur
	Takycardi eller bradycardi
	Apnoe
	Utvidet kapillær refyllingstid (CRT)
	Metabolsk acidose
	Hyperglykemi
	Andre tegn på BBI så som apati
	<i>Og</i>
	KNS blir påvist i blodkultur eller på katetertupp
	<i>Og pasienten har minst en av:</i>
	C-reaktivt protein > 2,0 mg/dL
	Immature/totale neutrofile ratio (I/T ratio) > 0,2
	Leukocytter < 5/nL
	Trombocytter < 100/nL

¹Sett kryss der hvor pasienten har symptomer i henhold til kasusdefinisjonen på registreringstidspunktet.

Sett kryss¹	NEO-PNEU: Pneumoni
	Kompromittert respirasjon
	Og nytt infiltrat, konsolidering eller pleuravæske påvist ved røntgen thorax
	Og minst fire av:
	Temperatur > 38 ⁰ C eller <36,5 ⁰ C eller ustabil temperatur
	Takycardi eller bradycardi
	Takypnoe eller apnoe
	Dyspnoe
	Økt luftveissekret
	Ny episode med purulent ekspektorat
	Påvisning av patogen mikroorganisme fra luftveissekret
	C-reaktivt protein > 2,0 mg/dL
	I/T ratio > 0,2

¹Sett kryss der hvor pasienten har symptomer i henhold til kase-definisjonen på registreringstidspunktet.

