

LA SYPHILIS

La syphilis est une maladie sexuellement transmissible qui se transmet lors de rapports sexuels par le contact entre les organes génitaux ou entre les organes génitaux et les muqueuses de la bouche ou du rectum. La maladie peut également se transmettre de mère à enfant pendant la grossesse ou par transfusion sanguine.

La syphilis a presque disparu en Norvège ces dix dernières années mais elle commence maintenant à réapparaître. Certains cas se sont déclarés à Oslo chez des hommes ayant eu des relations sexuelles avec d'autres hommes. De plus, la maladie est maintenant plus répandue chez les hétérosexuels. La syphilis est une maladie courante dans les pays de l'ex-Union Soviétique, dans de nombreux pays en voie de développement et dans certaines grandes villes des Etats-Unis.

Un préservatif correctement utilisé protège contre la contamination. Le préservatif doit être utilisé pendant toute la durée du rapport sexuel.

LES SYMPTÔMES

La syphilis se développe en trois stades:

Stade 1

Environ trois semaines après la contamination apparaît une plaie à l'endroit où les bactéries ont pénétré dans le corps. Cette plaie se trouve souvent sur les organes génitaux mais peut aussi se trouver dans le rectum, la bouche ou sur d'autres parties du corps. La plaie n'est pas très douloureuse et après quelques semaines elle disparaît d'elle-même sans traitement. Les ganglions lymphatiques les plus proches de la plaie vont gonfler mais ne sont pas sensibles. Parfois ce premier stade de la maladie passe inaperçu.

Stade 2

Si la maladie n'est pas traitée au stade 1, elle passe au bout d'environ deux mois au stade 2. Les symptômes les plus courants au stade 2 sont différentes éruptions cutanées, chute des cheveux, ganglions lymphatiques gonflés, un peu de fièvre, maux de tête et fatigue.

Latence

Si la maladie n'est pas traitée au stade 2, elle passe à un stade de latence où il n'y a pas de symptômes. Les dangers de transmission sexuelle sont réduits mais un fœtus peut toujours être contaminé pendant la grossesse.

Stade 3

Après de nombreuses années la maladie peut passer à un troisième stade, où elle attaque le cerveau, le système cardio-vasculaire, la peau et les os.

EXAMEN

Une simple prise de sang chez le médecin peut révéler si vous êtes atteint de syphilis. Cependant, un délai de plusieurs semaines entre contamination et cette analyse peut être nécessaire pour pouvoir révéler un résultat positif.

TRAITEMENT

Des injections de pénicilline représentent un traitement 100% efficace contre la syphilis. Pour les personnes allergiques à la pénicilline, il existe d'autres médicaments efficaces.

Vous ne devez pas avoir de rapports sexuels avant d'être déclaré guéri.

EXAMEN ET TRAITEMENT GRATUITS

La syphilis est définie comme étant une maladie constituant un danger public selon la loi sur la protection contre les contaminations. Ceci donne droit à des examens et du traitement gratuits. Il est important d'informer les partenaires présents et passés que vous êtes contaminé.

Le médecin et le patient doivent coopérer afin de retrouver les personnes susceptibles d'être contaminées pour pouvoir les examiner et les traiter.