

سیفلیس مورد در پاسخ و پرسش

چیست؟ سیفلیس

و دهد رخ مختلف مراحل در است ممکن مریضی این بشود می ایجاد باکتری توسط که است مقاربتی مریضی یک سیفلیس شود تبدیل جدی مریضی یک به تواند می، تداوی عدم در صورت

یابد؟ می انتقال چگونه سیفلیس

مادر از مریضی این سرایت شود می منتقل مقعد یا و دهان، تناسلی دستگاه در مخاطی غشاء طریق از جنسی راه از سیفلیس مرحله به عفونت به ابتلا خطر شود کودک در زادی مادر جدی مریضی ایجاد باعث ستان کم بارداری طریق از فرزند به دارد بستگی مریضی این

بدهم؟ فلیس سید آزمایش باید آیا

این شود می پیشنهاد رایگان آزمایش یک شما به، است بالا ان در سیفلیس مریضی به ابتلا میزان که هستید کشوری اهل اگر سیفلیس مریضی به ابتلا بالای خطر در معرض که اید بوده موقعیتی در اگر است داوطلبانه و است خون آزمایش یک آزمایش که بگیرید قرار رایگان آزمایش یک تحت توانید می، داشتید قرار

است اهمیت حائز بینید نمی خود در را مریضی این علائم اگر حتی، هستید سیفلیس به ابتلا بالای میزان با ای ناحیه اهل اگر این تداوی برای، باشد مثبت آزمایش نتیجه اگر است برخوردار اهمیت از باردار زنان برای ویژه به امر این دهید آزمایش که زیرا است اهمیت حائز مریضی این به ابتلا عدم یا ابتلا از اطلاع همچنین گرفت خواهید قرار رایگان تداوی تحت مریضی شوید افراد دیگر به مریضی این سرایت از مانع توانید می مریضی این به ابتلا از اطلاع در صورت

چیست؟ سیفلیس های نشانه و علائم

شده مبتلا مریضی این به اخیرا اگر باشید داشته علائمی که است بعید، اید شده مبتلا سیفلیس مریضی به پیش سال چندین اگر احساس سیفلیس، دیگر مقاربتی های مریضی از بسیاری برخلاف شود مختلفی علائم ایجاد باعث تواند می سیفلیس، اید ندارد همراه به را تناسلی دستگاه از ترشح و سوزش

در مثال عنوان به است شده بدن وارد آنجا از باکتری که است ای ناحیه در درد بدون زخمی ایجاد مریضی این نشانه ترین معمول از را دیگر علائم ماه چند عرض در، باکتری این به آلوده افراد از نیمی حدود تداوی بدون دهان یا انگشتان، جنسی های اندام سوم یک حدود، تعداد این از است مورزش و لنفاوی غدد تورم، بثورات، خستگی علائم این ترین معمول دهند می بروز خود و عروقی قلبی های مریضی ایجاد باعث تواند می این داد خواهند بروز ابتلا از پس سالها را سیفلیس شکل ترین جدی، افراد شود مغزی های مریضی

کنم؟ محافظت سیفلیس به ابتلا برابر در خودم از توانم می چگونه

و واژن طریق از جنسی رابطه برای کاندوم از استفاده سیفلیس مریضی به ابتلا برابر در خود از محافظت در اصل ترین مهم است دهان و مقعد

دهم؟ انجام توانم می اقدامی چه سیفلیس به ابتلا در صورت

باز را تان سلامتی، تداوی گرفت خواهید قرار ارزیابی مورد ها بیوتیک آنتی با تداوی برای، است مثبت آزمایش نتیجه اگر ارجاع اغلب گیرد می صورت تزریق طریق از تداوی کنید مبتلا را دیگران توانید نمی که است معنا بدان این و گرداند می است ضروری، تداوی برای متخصص یک به