

သင့်တွင် IGRA (အိုင်ဂျီအာရ်အေ) သွေးစစ်ဆေးမှုတွင် ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့လျှင်....

နော်ဝေးနိုင်ငံတွင် လူတစ်ချို့ကို IGRA (အိုင်ဂျီအာရ်အေ) သွေးစစ်ဆေးမှုကိုအသုံးပြုပြီး တီဘီရောဂါကို ပုံမှန်စစ်ဆေးပေးကြပါသည်။

IGRA (အိုင်ဂျီအာရ်အေ) သွေးစစ်ဆေးမှုတွင် ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ?

- IGRA (အိုင်ဂျီအာရ်အေ)သွေးစစ်ဆေးမှုတွင် ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့လျှင် သင့်မှာတီဘီရောဂါကူးစက်ခံနေရပြီဆိုသည့် အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း သင်နာမကျန်းဖြစ်နေပြီဟု မဆိုလိုပါ။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ သုံးပုံတစ်ပုံခန့်သည် ဘာရောဂါမှမခံစားရဘဲ IGRA (အိုင်ဂျီအာရ်အေ) စစ်ဆေးမှုမှာ ပိုးတွေ့နေရသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းလျှိုးကူးစက်ခံနေရသော သဘောဖြစ်သည်။

၎င်းလျှိုးကူးစက်ခံရမှုသည် အန္တရာယ် ရှိပါသလား။

- ၎င်းလျှိုးတီဘီကူးစက်ခံရသူသည် ဘဝတသက်တာအတွင်း တီဘီရောဂါဖြစ်လာနိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိပါသည်။ လူ(၂၀)တွင်တစ်ဦးခန့်က ၎င်းကိုခံစားရနိုင်သည်။ ရောဂါတစ်ခုခု (ဥပမာ- HIV(အိုက်ချ်အိုင်ဗီ)ကူးစက်မှု သို့မဟုတ် ကုသမှု (ဥပမာ - ကင်ဆာရောဂါ) ကြောင့် သင်၏ကိုယ်ခံအားစနစ်က အားသိပ်မကောင်းခဲ့လျှင် သင်သည်ကူးစက်ခံရပြီး မကြာမှီမှာပင် နာမကျန်းဖြစ်နိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းများပါသည်။ တီဘီရောဂါအတွက် ကုထုံးများရှိနေပြီဖြစ်သလို ဝေဒနာသည်အများစုသည်လည်း လုံးဝအရှင်းပျောက်ကင်းသက်သာနိုင်ပါသည်။

အခြားသူများကို ကူးစက်နိုင်ပါသလား?

- ၎င်းလျှိုးတီဘီရောဂါရှိသူများသည် ဖျားနာမှုမရှိကြသကဲ့သို့ အခြားသူများကိုလည်း မကူးစက်နိုင်ပါ။

ကုသမှုခံယူရန် လိုအပ်ပါသလား?

တချို့ကိစ္စရပ်များတွင် တီဘီဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကို တားဆီးရှောင်ရှားနိုင်စေရန် ကြိုတင်ကာ ကွယ်ကုသမှု လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအချက်သည် သင့်ဆရာဝန်ဆုံး ဖြတ်ရမည့် အချက်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းကုသမှုသည် အထူးသဖြင့် လတ်တလောကူးစက် ခံထားရသူများ၊ ခလေးငယ်များနှင့် ကိုယ်ခံအားစနစ် အားနည်းသူများအပါအဝင် အချို့ လူများအတွက် သက်ဆိုင်ပါသည်။

အထူးသတိထားရမည့်အချက်များ ရှိပါသလား?

- IGRA (အိုင်ဂျီအာရ်အေ) ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးမှုတွင် ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသည်ဆိုသည်မှာ သင့်အနေဖြင့် သင့်လူမှုဘဝနေထိုင်ပုံကို ပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်နေပြီဆိုသည့် အဓိပ္ပာယ် မသက်ရောက်သော်လည်း သင်ဖျားနာလာပြီဆိုလျှင် သင်သည်မှန်ကန်သည့်ပြုစုကုသမှု ရရှိရန်အတွက် သင့်တွင် (IGRA) (အိုင်ဂျီအာရ်အေ) ပိုးတွေ့ခြင်း(သို့မဟုတ်) လက္ခဏာ ပြသည့် ငှပ်လျှိုးတီဘီရောဂါပိုးရှိနေကြောင်း သင့်ဆရာဝန်အား အသိပေးရပါမည်။

အောက်ပါအချက်များသည် သင့်မှာတီဘီရောဂါဖြစ်နေသည့် လက္ခဏာရပ်များဖြစ်သည်။

- ချောင်းဆိုးကြာရှည်ခြင်း (၃ ပါတ်ကျော် ကြာသည်အထိ)
- ကြာရှည်စွာ ဖျားခြင်း
- ညဖက် ချွေးထွက်ခြင်း
- ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျလာခြင်း

နောက်ထပ်အချက်အလက်များကို ဘယ်မှာရှာလို့ ရနိုင်မလဲ?

<http://www.fhi.no/tema/tuberkulose/informasjon-til-pasienter>